

11. CONOCIMIENTO DE VIH E ITS



11. CONOCIMIENTO DE VIH E ITS



En la mayoría de los países en desarrollo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de aquellas relacionadas con la maternidad. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen un mecanismo de intervención que mejora la salud pública, dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan, y evita la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El comportamiento del VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el Perú es el de una epidemia concentrada, así desde el primer caso diagnosticado de SIDA en el Perú en el año 1983 hasta diciembre de 2015, se han reportado 33 mil 333 casos de SIDA y 60 mil 026 casos notificados de VIH¹ pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la inexistencia de cura para la enfermedad y la relación entre ITS y VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre la transmisión, prevención y percepción de los riesgos.

El cuestionario individual de la Encuesta 2015 sigue incluyendo una sección, con preguntas previamente evaluadas y mejoradas, para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las infecciones transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas infecciones, si han adquirido infecciones en los 12 meses anteriores a la entrevista y, en caso positivo, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo. Con relación al VIH/SIDA, se indagó sobre qué debe hacerse para evitar contraer el VIH, si una persona puede ser VIH-positiva aunque parezca saludable, y si cree que el VIH puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas con VIH-positivo para participar en el mercado laboral o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses: número y tipo de parejas sexuales y uso del condón.


11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR

A las mujeres entrevistadas se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA. A quienes respondieron afirmativamente, se indagó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH. Se presenta el conocimiento de formas programáticas y específicas de evitar el virus, la percepción de la entrevistada sobre el riesgo de infección por el VIH y los aspectos sociales de la prevención y mitigación.

1 / Ministerio de Salud: Dirección General de Epidemiología / Boletín Mensual Diciembre 2015.

Conocimiento de VIH/SIDA

- Del total de mujeres entrevistadas en la Encuesta 2015, el 98,0% conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA lo que implica una mejora de 1,9 puntos porcentuales, en relación con el año 2011 (96,1%).
- En el año 2015, el 5,5% de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos consideradas de importancia programática para evitar el VIH. En el año 2011, este porcentaje fue 6,6%.
- Con respecto a los aspectos relacionados con el VIH/SIDA, aquellas entrevistadas sin nivel de educación (21,8%) y las que pertenecen al quintil inferior de riqueza (9,3%) constituyen el mayor porcentaje de mujeres que desconoce sobre el VIH/SIDA.
- Según área de residencia, este porcentaje fue mayor en el área rural (7,5%), en comparación a la urbana (0,6%) y por departamento en Cajamarca se registró el mayor porcentaje de mujeres con desconocimiento sobre el VIH/SIDA (7,0%), seguido por Apurímac (6,3%), Amazonas (5,6%) y Puno (5,3%).
- Sobre el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, el 85,7% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”; con relación al año 2011 se aprecia un incremento de 2,6 puntos porcentuales. Asimismo, el conocimiento sobre el uso del condón creció al pasar de 74,6%, en el año 2011 a 78,4% en el 2015.



CUADRO N° 11.1
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Edad								
15-19	100,0	2,2	7,4	27,5	62,9	71,4	81,9	5 983
20-24	100,0	1,8	5,5	20,1	72,7	79,8	85,7	5 291
25-29	100,0	1,5	4,7	19,2	74,6	80,9	87,4	5 195
30-39	100,0	1,8	4,9	18,6	74,7	80,7	87,2	10 427
40-49	100,0	2,5	5,5	20,6	71,4	78,0	85,4	8 870
15-24	100,0	2,0	6,5	24,0	67,5	75,3	83,7	11 274
Estado conyugal								
Soltera	100,0	2,3	6,0	22,9	68,7	75,6	84,7	10 897
Ha tenido RS	100,0	1,5	4,5	18,4	75,6	82,0	87,6	5 114
Nunca ha tenido RS	100,0	3,1	7,4	26,9	62,6	70,0	82,1	5 783
Casada o Conviviente	100,0	2,1	5,4	20,2	72,4	79,1	85,9	20 686
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	0,8	4,9	19,2	75,1	82,3	87,1	4 184
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	21,8	13,5	23,0	41,6	49,5	56,7	604
Primaria	100,0	6,6	10,6	23,1	59,8	68,4	74,3	6 930
Secundaria	100,0	0,7	4,9	22,2	72,2	79,7	86,8	16 655
Superior	100,0	0,0	3,0	17,7	79,3	84,0	92,3	11 576
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	9,3	11,3	22,5	56,8	65,3	70,8	6 007
Segundo quintil	100,0	1,2	5,7	21,7	71,3	80,0	84,4	6 884
Quintil intermedio	100,0	0,6	3,8	21,1	74,6	81,6	88,7	7 608
Cuarto quintil	100,0	0,3	4,6	21,5	73,7	79,1	89,7	7 803
Quintil superior	100,0	0,0	3,4	18,0	78,5	83,5	91,6	7 463
Total 2015	100,0	2,0	5,5	20,9	71,6	78,4	85,7	35 766
Total 2011	100,0	3,9	6,6	21,3	68,2	74,6	83,1	22 517

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.2
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Área de residencia								
Urbana	100,0	0,6	4,4	20,6	74,5	80,9	88,7	28 380
Rural	100,0	7,5	10,0	22,1	60,4	68,8	74,0	7 386
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	100,0	0,4	3,7	20,5	75,5	81,5	89,8	11 869
Resto Costa	100,0	1,0	5,0	19,8	74,2	79,9	88,4	9 323
Sierra	100,0	4,7	7,3	21,6	66,3	74,2	80,0	9 613
Selva	100,0	2,4	7,4	22,7	67,5	76,1	81,6	4 962
Departamento								
Amazonas	100,0	5,6	9,3	21,0	64,1	72,5	76,6	452
Áncash	100,0	4,5	3,9	20,5	71,2	75,7	87,2	1 314
Apurímac	100,0	6,3	3,4	19,1	71,2	73,8	87,7	513
Arequipa	100,0	0,7	7,3	25,7	66,3	75,4	82,8	1 598
Ayacucho	100,0	4,0	3,6	17,9	74,6	78,4	88,6	649
Cajamarca	100,0	7,0	8,7	19,8	64,4	71,3	77,4	1 791
Prov. Const. Del Callao	100,0	0,5	5,5	21,5	72,5	80,1	86,4	1 282
Cusco	100,0	3,4	6,6	20,8	69,2	79,7	79,6	1 271
Huancavelica	100,0	2,7	5,7	19,9	71,6	78,4	84,8	422
Huánuco	100,0	3,9	10,0	21,9	64,1	72,9	77,3	817
Ica	100,0	0,2	3,7	19,2	76,9	81,2	91,7	1 001
Junín	100,0	0,9	4,0	20,1	74,9	81,0	89,0	1 355
La Libertad	100,0	3,0	6,9	18,9	71,2	78,9	82,4	2 209
Lambayeque	100,0	1,2	3,9	19,8	75,1	79,6	90,4	1 568
Lima	100,0	0,5	3,7	20,2	75,6	81,6	89,9	11 644
Provincia de Lima 4/	100,0	0,4	3,5	20,3	75,8	81,7	90,2	10 587
Lima Provincias 5/	100,0	2,0	5,5	18,9	73,7	79,9	86,4	1 058
Loreto	100,0	3,7	8,8	22,9	64,6	73,7	78,4	1 266
Madre de Dios	100,0	1,0	7,0	23,8	68,2	76,2	84,0	160
Moquegua	100,0	1,4	3,9	21,5	73,2	81,0	86,9	212
Pasco	100,0	1,3	6,4	18,2	74,2	82,6	83,9	287
Piura	100,0	1,9	6,4	21,1	70,5	76,6	85,6	2 394
Puno	100,0	5,3	9,1	26,3	59,3	71,2	73,7	1 278
San Martín	100,0	0,2	6,5	24,7	68,6	75,8	86,2	1 021
Tacna	100,0	0,7	7,7	19,7	72,0	80,4	83,2	384
Tumbes	100,0	0,2	4,9	21,5	73,4	78,8	89,4	299
Ucayali	100,0	1,5	8,1	21,1	69,3	78,8	80,9	579
Total 2015	100,0	2,0	5,5	20,9	71,6	78,4	85,7	35 766
Total 2011	100,0	3,9	6,6	21,3	68,2	74,6	83,1	22 517

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.2 CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH con el propósito de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Específicamente se les preguntó si una persona que parece saludable puede ser VIH-positiva y si puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Aspectos relacionados con el VIH

- El 79,4% de mujeres entrevistadas en el año 2015 manifestó que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, incrementándose en 3,7 puntos porcentuales con respecto al año 2011 (75,7%). Concomitantemente se constata una mejora entre las mujeres que respondieron “No sabe o no tiene información”, al registrar un porcentaje menor en el año 2015 (6,5%) respecto al año 2011 (9,9%). En efecto en términos comparativos disminuyó en 3,4 puntos porcentuales.
- Las mujeres que respondieron en mayor porcentaje acerca de que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, fueron las que alcanzaron educación superior (91,6%) así como las ubicadas en el quintil superior de riqueza (90,6%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (84,2%) que en el área rural (60,8%).
- En 11 departamentos, incluida la Provincia Constitucional del Callao, más del 80% de mujeres opinó que una persona que parece saludable puede tener el VIH, los cuales son: Lima (86,2%), Ica (85,4%), Provincia Constitucional del Callao (84,5%), San Martín (83,9%), Arequipa (82,9%), Moquegua (82,7%), Tumbes (82,7%), Ucayali (81,9%), Junín (81,2%), Madre de Dios (80,9%) y Lambayeque (80,5%).
- Son muy preocupantes los datos obtenidos respecto a la transmisión vertical (madre a hija o hijo) del VIH. Al respecto, se constató que el 19,0% de mujeres no consideraron esta posibilidad.
- Entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 69,0% mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto, frente al 64,2% de esa respuesta en el 2011 y un 34,8% se refirió con la lactancia, frente a 37,9% del 2011.

CUADRO N° 11.3
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo			Número de mujeres	
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia		No sabe 2/
Edad								
15-19	77,5	17,2	5,3	19,6	66,3	37,4	2,2	5 983
20-24	81,8	12,6	5,6	18,2	69,0	37,6	1,8	5 291
25-29	81,5	12,9	5,6	16,9	72,1	37,1	1,5	5 195
30-39	79,8	13,8	6,4	18,0	71,3	33,7	1,8	10 427
40-49	77,4	14,3	8,2	21,4	66,3	31,3	2,5	8 870
15-24	79,5	15,0	5,4	19,0	67,6	37,5	2,0	11 274
Estado conyugal								
Soltera	81,5	13,4	5,2	18,0	70,7	36,0	2,3	10 897
Ha tenido RS	86,4	9,7	4,0	15,5	73,7	35,8	1,5	5 114
No ha tenido RS	77,1	16,6	6,2	20,1	68,0	36,3	3,1	5 783
Casada o Conviviente	77,8	15,1	7,2	20,5	67,1	34,0	2,1	20 686
Divorciada/Separada/Viuda	81,8	12,0	6,2	14,0	73,9	35,4	0,8	4 184
Nivel de educación								
Sin educación	40,7	25,2	34,1	60,2	25,5	20,6	21,8	604
Primaria	61,1	23,1	15,8	40,2	44,0	27,6	6,6	6 930
Secundaria	79,9	15,3	4,9	16,2	70,4	35,6	0,7	16 655
Superior	91,6	6,7	1,7	8,1	84,1	38,7	0,0	11 576
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	56,8	25,0	18,2	42,0	41,3	28,8	9,3	6 007
Segundo quintil	75,9	17,6	6,5	21,0	64,7	35,2	1,2	6 884
Quintil intermedio	82,8	13,1	4,1	15,6	72,6	35,4	0,6	7 608
Cuarto quintil	85,7	10,8	3,5	11,6	78,7	36,2	0,3	7 803
Quintil superior	90,6	7,0	2,4	9,8	81,4	37,3	0,0	7 463
Total 2015	79,4	14,2	6,5	19,0	69,0	34,8	2,0	35 766
Total 2011	75,7	14,4	9,9	20,9	64,2	37,9	3,9	22 517

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.4
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
Área de residencia								
Urbana	84,2	11,8	4,0	14,2	74,8	36,0	0,6	28 380
Rural	60,8	23,4	15,8	37,1	46,8	30,3	7,5	7 386
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	86,5	10,1	3,4	11,6	77,5	38,4	0,4	11 869
Resto Costa	82,0	12,7	5,3	17,9	71,1	32,8	1,0	9 323
Sierra	69,6	19,2	11,2	28,3	58,6	30,9	4,7	9 613
Selva	76,3	17,0	6,7	20,7	64,6	37,5	2,4	4 962
Departamento								
Amazonas	63,7	23,4	12,9	28,9	58,1	34,3	5,6	452
Áncash	79,0	9,3	11,7	19,5	68,7	35,5	4,5	1 314
Apurímac	71,1	15,4	13,6	29,4	53,4	38,2	6,3	513
Arequipa	82,9	11,7	5,5	14,7	77,1	26,3	0,7	1 598
Ayacucho	70,2	17,6	12,2	30,2	54,1	33,9	4,0	649
Cajamarca	65,0	20,9	14,1	35,7	52,7	28,1	7,0	1 791
Prov. Const. Del Callao	84,5	12,5	3,0	12,8	76,2	32,6	0,5	1 282
Cusco	67,7	23,9	8,4	18,0	66,7	43,1	3,4	1 271
Huancavelica	67,8	26,2	6,1	20,4	53,3	48,5	2,7	422
Huánuco	68,4	21,7	9,9	23,3	60,1	31,9	3,9	817
Ica	85,4	9,8	4,8	12,5	74,4	41,4	0,2	1 001
Junín	81,2	15,0	3,9	13,9	72,3	34,7	0,9	1 355
La Libertad	77,5	12,5	10,0	29,5	63,4	22,5	3,0	2 209
Lambayeque	80,5	10,9	8,6	20,4	72,4	23,6	1,2	1 568
Lima	86,2	10,2	3,7	11,8	77,2	39,3	0,5	11 644
Provincia de Lima 4/	86,7	9,8	3,5	11,4	77,7	39,1	0,4	10 587
Lima Provincias 5/	81,0	13,7	5,3	15,3	72,0	41,1	2,0	1 058
Loreto	74,0	19,0	7,0	27,5	56,7	34,6	3,7	1 266
Madre de Dios	80,9	14,3	4,8	17,8	68,2	36,0	1,0	160
Moquegua	82,7	11,3	6,0	16,8	75,3	33,3	1,4	212
Pasco	72,4	24,0	3,6	22,7	64,4	31,2	1,3	287
Piura	77,1	18,8	4,2	20,2	65,7	36,1	1,9	2 394
Puno	64,5	24,4	11,1	40,5	48,2	21,0	5,3	1 278
San Martín	83,9	12,0	4,1	10,8	70,1	48,4	0,2	1 021
Tacna	77,9	13,9	8,2	22,3	67,4	30,6	0,7	384
Tumbes	82,7	12,7	4,6	19,1	65,3	43,5	0,2	299
Ucayali	81,9	12,9	5,2	21,6	67,9	35,0	1,5	579
Total 2015	79,4	14,2	6,5	19,0	69,0	34,8	2,0	35 766
Total 2011	75,7	14,4	9,9	20,9	64,2	37,9	3,9	22 517

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Hurochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Aspectos sociales de la prevención del VIH

- Del total de mujeres entrevistadas que conoce del VIH/SIDA, cerca de dos tercios (62,7%) opinó que una maestra o maestro con VIH si puede seguir enseñando, sin embargo, aún una proporción importante de mujeres piensan lo contrario (32,7%).
- Las opiniones sobre si la persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo fueron las siguientes: el 18,2% opinó que si puede ser despedida y 77,4% manifestó que “no”.
- Si las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a cuidar en el hogar a un pariente con el VIH: la respuesta afirmativa (sí lo harían), llega al 77,3% en el 2015.
- La respuesta “No sabe”, menos del 5% a cada una de las tres preguntas mencionadas, también debe llamar la atención por su relevancia en las acciones que se debe tomar para el futuro. El 4,6% de mujeres no sabía si a una maestra (o) con VIH se le debe permitir o no continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad; igualmente, un 4,4% no sabía si una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo; y un 4,5% no sabía si cuidaría en el hogar a un pariente que vive con el VIH.
- Se observa que la mayoría de mujeres que opinaron que una maestra (o) con VIH no debe continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad se ubican en el quintil inferior de riqueza (61,7%) seguidas por las de educación primaria (60,0%). Por área de residencia, en la rural (57,8%).
- El mayor porcentaje de mujeres que opinó que una persona con el VIH no puede ser despedida del trabajo, se encuentra especialmente entre las mujeres con educación superior (92,8%), ubicadas en el quintil superior de riqueza (91,6%), con residencia urbana (84,3%) y en la Provincia Constitucional del Callao (89,9%), los departamentos Lima (88,5%), Ica (87,5%), Tumbes (84,2%), Moquegua (83,3%), Tacna (83,0%), Lambayeque (82,9%), Arequipa (81,4%).
- Asimismo, entre aquellas que manifestaron estarían dispuestas a cuidar a un pariente VIH-positivo en el hogar, mayor porcentaje se presentó en las mujeres con educación superior (83,3%), y solteras que han tenido relaciones sexuales (84,3%). Por área de residencia, en la urbana (80,9%).

CUADRO N° 11.5
PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DEL VIRUS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Edad										
15-19	59,3	36,5	4,2	17,1	78,9	4,1	78,8	17,1	4,1	5 983
20-24	66,6	29,2	4,2	15,6	80,2	4,2	77,4	18,3	4,4	5 291
25-29	65,4	30,8	3,9	15,3	81,1	3,6	76,5	18,8	4,8	5 195
30-39	63,1	32,2	4,7	19,2	76,5	4,3	75,9	19,3	4,8	10 427
40-49	60,6	34,2	5,2	20,9	73,8	5,3	78,4	17,1	4,5	8 870
15-24	62,8	33,0	4,2	16,4	79,5	4,1	78,1	17,7	4,2	11 274
Estado conyugal										
Soltera	68,7	27,0	4,3	13,3	82,8	3,9	82,5	13,3	4,1	10 897
Ha tenido RS	73,7	23,1	3,2	11,4	85,6	3,0	84,3	12,3	3,4	5 114
Nunca ha tenido RS	64,3	30,5	5,2	15,0	80,2	4,7	81,0	14,2	4,8	5 783
Casada o Conviviente	58,7	36,3	5,0	21,2	73,9	4,9	74,2	20,8	5,0	20 686
Divorciada/Separada/Viuda	66,9	29,8	3,3	15,8	80,7	3,4	79,2	17,7	3,1	4 184
Nivel de educación										
Sin educación	18,7	55,1	26,2	39,2	30,6	30,2	48,8	26,4	24,8	604
Primaria	30,5	60,0	9,4	39,5	49,4	11,1	65,4	26,2	8,4	6 930
Secundaria	62,8	33,4	3,8	16,8	80,1	3,2	79,1	17,2	3,6	16 655
Superior	84,2	14,2	1,6	6,4	92,8	0,9	83,3	14,2	2,5	11 576
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	26,3	61,7	12,0	40,0	46,2	13,8	59,3	29,4	11,3	6 007
Segundo quintil	53,3	42,4	4,3	25,9	69,9	4,3	77,7	18,4	3,9	6 884
Quintil intermedio	66,9	29,6	3,5	13,9	83,2	2,9	81,3	15,0	3,7	7 608
Cuarto quintil	76,9	20,3	2,8	9,0	88,9	2,1	83,4	13,7	2,9	7 803
Quintil superior	81,6	16,6	1,7	7,5	91,6	0,9	80,9	16,8	2,3	7 463
Total 2015	62,7	32,7	4,6	18,2	77,4	4,4	77,3	18,2	4,5	35 766
Total 2011	56,9	36,3	6,8	23,1	69,7	7,2	72,2	20,1	7,7	22 517

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.6
PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Área de residencia										
Urbana	70,7	26,2	3,1	13,1	84,3	2,6	80,9	15,9	3,2	28 380
Rural	32,1	57,8	10,1	37,8	50,8	11,4	63,4	26,9	9,6	7 385
Región natural										
Lima Metropolitana 1/	76,1	21,3	2,6	8,8	89,3	2,0	81,4	15,8	2,8	11 869
Resto Costa	65,6	30,6	3,8	14,8	81,8	3,4	80,5	15,3	4,2	9 322
Sierra	47,5	45,0	7,5	29,0	62,8	8,2	70,2	22,8	7,1	9 613
Selva	54,7	40,4	4,9	26,1	69,0	4,9	75,3	20,2	4,4	4 962
Departamento										
Amazonas	42,7	48,7	8,6	27,4	62,2	10,4	70,6	21,4	8,0	452
Áncash	57,7	35,0	7,4	21,9	70,5	7,6	77,2	15,3	7,5	1 314
Apurímac	39,0	52,8	8,2	41,1	49,6	9,3	68,9	22,2	8,9	513
Arequipa	69,1	26,6	4,4	15,5	81,4	3,1	78,3	17,6	4,1	1 598
Ayacucho	47,5	46,1	6,4	31,8	59,9	8,3	73,2	20,7	6,1	649
Cajamarca	40,7	49,7	9,6	31,8	56,9	11,3	69,5	21,1	9,4	1 791
Prov. Const. Del Callao	76,2	21,6	2,3	8,0	89,9	2,1	81,0	16,4	2,6	1 282
Cusco	48,9	45,2	6,0	27,9	66,3	5,8	69,3	25,6	5,1	1 271
Huancavelica	36,0	60,3	3,7	48,6	47,1	4,3	66,9	29,3	3,8	422
Huánuco	44,7	49,4	5,9	33,3	61,1	5,6	69,0	25,7	5,3	817
Ica	68,5	28,2	3,3	10,3	87,5	2,1	76,6	19,5	3,9	1 001
Junín	63,4	34,3	2,3	23,4	74,5	2,1	79,9	17,3	2,9	1 355
La Libertad	59,1	31,9	9,0	18,5	71,6	10,0	77,6	15,1	7,3	2 209
Lambayeque	66,0	29,7	4,3	13,0	82,9	4,1	82,8	11,8	5,4	1 568
Lima	75,3	22,0	2,8	9,4	88,5	2,1	81,3	15,7	3,0	11 644
Provincia de Lima 2/	76,1	21,3	2,6	8,9	89,2	1,9	81,5	15,7	2,8	10 587
Lima Provincias 3/	67,2	28,8	4,0	14,6	81,8	3,5	79,1	15,7	5,2	1 058
Loreto	51,5	42,1	6,4	25,3	68,7	6,0	70,2	24,8	5,0	1 266
Madre de Dios	60,0	35,5	4,5	17,8	78,9	3,3	79,6	16,0	4,5	160
Moquegua	69,5	23,9	6,6	12,1	83,3	4,5	81,3	12,8	5,8	212
Pasco	54,7	42,3	3,0	26,2	71,6	2,3	74,9	23,0	2,1	287
Piura	57,0	40,1	2,9	19,2	78,3	2,5	79,0	17,7	3,3	2 394
Puno	38,3	54,0	7,7	29,7	62,1	8,2	62,5	30,8	6,7	1 278
San Martín	55,8	41,7	2,4	23,3	73,0	3,6	79,2	17,3	3,5	1 021
Tacna	70,7	25,1	4,2	13,3	83,0	3,7	74,7	18,9	6,4	384
Tumbes	69,1	27,8	3,1	13,1	84,2	2,6	83,6	14,3	2,2	299
Ucayali	71,9	24,9	3,2	30,8	66,6	2,6	79,9	17,8	2,3	579
Total 2015	62,7	32,7	4,6	18,2	77,4	4,4	77,3	18,2	4,5	35 766
Total 2011	56,9	36,3	6,8	23,1	69,7	7,2	72,2	20,1	7,7	22 517

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Los programas de control de VIH reconocen, en la actualidad, la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del virus. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ITS. Asimismo, poco se sabe sobre cómo las personas perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la Encuesta 2015, se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales; cuáles son las enfermedades que conocía; y que síntomas y signos pueden hacer parecer que una mujer o un hombre tenía una infección de transmisión sexual.

Conocimiento de las ITS

- El 67,9% de mujeres entrevistadas en la encuesta 2015, conoce sobre las ITS, pero si se considera que casi un tercio (32,1%) de entrevistadas declaró desconocerlas, entonces se debe reconocer que existe un grave problema de salud, pues implica un riesgo potencial de adquirirlas y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo, así como las importantes implicancias económicas y sociales que eso representa
- El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres sin nivel de educación (73,4%), así como en las mujeres ubicadas en el quintil inferior (63,0%). Por área de residencia, fue mayor en el área rural (59,9%) y por departamento, Cajamarca (65,9%), Pasco (56,8%), Apurímac (56,5%), Huancavelica (56,2%) y Amazonas (50,0%).



- Un 21,8% de las mujeres entrevistadas no conocía síntomas de las ITS, lo que revela que no se avanzó mucho desde el 2011 (que era el 21,5%), un 17,6% conocía un síntoma y 28,6% dos o más síntomas. Estos porcentajes significan que una gran mayoría de mujeres no sabría identificar una ITS con el consiguiente riesgo de transmitirla a otras personas, no recibir un tratamiento oportuno y padecer secuelas o complicaciones a futuro.

- Respecto a ITS específicas, la más conocida por las mujeres que conocen alguna ITS, sigue siendo la sífilis (41,8%), le sigue la gonorrea (36,5%) que ha tendido a disminuir en comparación al 2011 (40,7%). Por el contrario, hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que conocen las verrugas genitales/condiloma (de 4,1% en el año 2011 a 5,6% en el año 2015).
- La sífilis fue la enfermedad más reconocida por las mujeres con nivel de educación superior (58,9%) y el quintil superior de riqueza (54,1%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (44,6%) y, por departamento la mitad o algo más de mujeres de Ucayali (52,1%), Junín (51,0%) y la Provincia Constitucional del Callao (50,9%) conocen la sífilis y en el departamento de Lima el 47,8%, en especial en la provincia de Lima (48,1%).
- La gonorrea fue más conocida en mujeres con educación superior (48,5%), en las ubicadas en el quintil superior de bienestar (43,5%) y las solteras que han tenido relaciones sexuales (43,3%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (38,4%) y por departamento, en Ucayali (69,7%), Loreto (60,3%) y San Martín (56,1%).

CUADRO N° 11.7
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y
MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes	Otras ITS 1/	
Edad													
15-19	100,0	40,4	24,8	17,5	17,3	5 983	27,5	29,8	5,4	10,8	17,5	14,6	3 565
20-24	100,0	31,4	24,2	16,2	28,2	5 291	42,8	37,7	6,0	15,4	15,4	19,1	3 631
25-29	100,0	27,5	19,6	19,4	33,5	5 195	50,1	43,4	4,5	21,0	15,3	19,5	3 766
30-39	100,0	29,4	20,4	18,0	32,2	10 427	48,3	39,8	5,9	18,2	11,2	17,7	7 359
40-49	100,0	32,6	21,1	16,9	29,4	8 870	36,5	31,5	5,9	18,6	8,4	18,0	5 982
15-24	100,0	36,2	24,5	16,9	22,4	11 274	35,2	33,8	5,7	13,2	16,4	16,8	7 196
Estado conyugal													
Soltera	100,0	30,9	23,1	19,1	26,9	10 897	39,5	38,8	5,8	15,2	19,7	19,1	7 526
Ha tenido RS	100,0	20,9	20,8	21,9	36,3	5 114	45,8	43,3	6,4	16,9	20,8	23,3	4 044
Nunca ha tenido RS	100,0	39,8	25,1	16,6	18,6	5 783	32,2	33,4	5,1	13,2	18,4	14,3	3 482
Casada o Conviviente	100,0	34,0	21,1	16,5	28,5	20 686	42,6	35,3	5,6	17,7	9,5	16,5	13 655
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	25,4	21,8	19,0	33,8	4 184	43,8	36,7	5,1	20,2	9,6	20,4	3 121
Nivel de educación													
Sin educación	100,0	73,4	17,0	5,4	4,1	604	3,6	11,3	1,6	17,0	0,1	11,4	161
Primaria	100,0	60,8	21,4	8,3	9,6	6 930	9,8	15,4	1,6	9,5	2,4	13,0	2 719
Secundaria	100,0	33,9	25,2	17,8	23,1	16 655	34,0	30,8	4,9	13,7	9,9	17,2	11 003
Superior	100,0	10,0	17,3	23,5	49,2	11 576	58,9	48,5	7,4	23,0	18,5	19,7	10 420
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	100,0	63,0	19,4	8,9	8,8	6 007	16,7	22,8	1,7	14,1	2,6	9,7	2 225
Segundo quintil	100,0	42,6	22,9	14,5	20,1	6 884	31,3	32,7	4,0	17,6	6,8	13,7	3 954
Quintil intermedio	100,0	29,1	24,8	18,2	28,0	7 608	38,8	34,5	5,5	16,4	11,0	15,0	5 398
Cuarto quintil	100,0	21,2	22,1	21,8	34,9	7 803	47,1	38,3	6,3	16,9	14,9	20,1	6 151
Quintil superior	100,0	11,9	19,2	22,3	46,6	7 463	54,1	43,5	7,4	19,1	19,0	23,2	6 574
Total 2015	100,0	32,1	21,8	17,6	28,6	35 766	41,8	36,5	5,6	17,3	12,7	17,8	24 302
Total 2011	100,0	37,7	21,5	15,4	25,3	22 517	44,9	40,7	4,1	21,4	9,3	9,9	14 019

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.8
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y
MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes	Otras ITS 1/	
Área de residencia													
Urbana	100,0	24,8	22,3	19,7	33,2	28 380	44,6	38,4	6,0	17,5	13,7	18,7	21 344
Rural	100,0	59,9	19,9	9,3	10,9	7 386	21,3	23,1	2,4	15,4	5,3	11,4	2 958
Región natural													
Lima Metropolitana 2/	100,0	21,0	19,3	20,9	38,7	11 869	48,4	36,7	7,0	16,8	15,3	23,3	9 372
Resto Costa	100,0	31,9	26,0	17,6	24,6	9 323	39,5	34,8	5,6	12,0	12,5	15,8	6 353
Sierra	100,0	46,4	21,5	13,5	18,6	9 613	33,4	27,2	3,8	20,3	11,1	14,3	5 154
Selva	100,0	31,0	20,1	17,4	31,5	4 962	40,7	53,4	4,8	23,5	8,1	11,7	3 424
Departamento													
Amazonas	100,0	50,0	21,7	12,3	15,9	452	34,7	34,0	2,7	30,2	7,8	8,5	226
Áncash	100,0	38,3	21,2	15,3	25,3	1 314	37,2	31,0	7,6	13,2	11,5	10,6	811
Apurímac	100,0	56,5	17,8	12,4	13,2	513	28,7	19,2	3,7	24,6	8,2	33,1	223
Arequipa	100,0	16,8	24,9	20,9	37,4	1 598	41,1	34,2	5,1	19,5	14,8	17,8	1 330
Ayacucho	100,0	49,1	21,1	14,5	15,2	649	34,7	31,4	3,6	26,3	8,9	19,8	330
Cajamarca	100,0	65,9	14,3	8,9	11,0	1 791	37,9	33,9	0,9	20,3	12,8	2,6	611
Prov. Const. Del Callao	100,0	29,1	19,6	18,7	32,6	1 282	50,9	35,6	6,5	14,4	15,4	23,9	909
Cusco	100,0	44,4	18,1	11,9	25,6	1 271	39,1	27,1	2,3	22,2	10,8	17,8	706
Huancavelica	100,0	56,2	12,1	13,5	18,2	422	22,9	13,7	5,8	23,6	8,1	3,4	185
Huánuco	100,0	36,4	24,0	17,8	21,9	817	36,1	32,5	6,4	22,6	8,4	21,4	520
Ica	100,0	20,6	24,3	20,0	35,1	1 001	40,3	32,3	7,5	13,6	10,9	18,6	795
Junín	100,0	42,5	17,1	19,0	21,4	1 355	51,0	39,3	5,2	36,7	12,3	14,6	779
La Libertad	100,0	20,9	42,9	18,2	18,0	2 209	31,5	28,4	4,2	8,9	9,7	15,1	1 747
Lambayeque	100,0	44,3	26,2	13,6	15,8	1 568	41,0	38,9	3,1	13,3	14,2	12,8	873
Lima	100,0	21,3	19,4	20,9	38,4	11 644	47,8	36,6	7,2	16,8	15,0	23,1	9 161
Provincia de Lima 3/	100,0	20,1	19,3	21,2	39,4	10 587	48,1	36,8	7,0	17,1	15,3	23,2	8 463
Lima Provincias 4/	100,0	33,9	19,9	17,6	28,6	1 058	44,8	34,0	9,2	13,0	10,9	21,3	699
Loreto	100,0	30,9	24,5	17,3	27,3	1 266	41,5	60,3	7,3	20,8	5,8	5,6	875
Madre de Dios	100,0	32,2	24,7	17,3	25,8	160	39,2	39,3	4,8	24,3	9,2	14,1	109
Moquegua	100,0	20,3	31,5	18,3	29,9	212	47,6	35,2	2,8	18,7	13,1	19,8	169
Pasco	100,0	56,8	10,9	11,6	20,7	287	39,3	36,5	4,6	29,8	10,9	6,5	124
Piura	100,0	44,5	19,0	15,7	20,8	2 394	35,1	34,9	4,2	10,3	15,2	15,3	1 329
Puno	100,0	49,8	27,0	11,2	12,1	1 278	19,0	20,6	3,1	14,0	9,1	8,5	642
San Martín	100,0	7,5	19,8	22,5	50,2	1 021	31,7	56,1	3,0	19,6	6,5	16,5	944
Tacna	100,0	32,4	26,6	20,6	20,4	384	38,9	35,3	4,5	10,8	15,2	15,3	260
Tumbes	100,0	36,7	20,7	16,5	26,1	299	41,0	38,6	4,6	14,2	12,3	4,7	189
Ucayali	100,0	21,4	16,9	14,4	47,3	579	52,1	69,7	4,6	21,4	10,1	10,5	455
Total 2015	100,0	32,1	21,8	17,6	28,6	35 766	41,8	36,5	5,6	17,3	12,7	17,8	24 302
Total 2011	100,0	37,7	21,5	15,4	25,3	22 517	44,9	40,7	4,1	21,4	9,3	9,9	14 019

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.v

Síntomas y signos de las ITS

- En cuanto a los síntomas y signos específicos de las ITS, de los cuales tenían conocimiento las mujeres entrevistadas, están el enrojecimiento/picazón en genitales (26,7%), seguido de úlceras/llagas genitales (21,1%), inflamación o hinchazón en genitales (17,4%), pérdida de peso (16,7%), secreción mal oliente (16,4%) y secreción por genital (15,1%).
- En relación al enrojecimiento/picazón en genitales, el mayor porcentaje fue mencionado por las mujeres con educación superior (34,4%), las ubicadas en el quintil superior de riqueza (33,4%). Por área de residencia, fue más alto el porcentaje en el área urbana (28,0%) y por departamento, en San Martín (42,2%), Provincia Constitucional del Callao (33,3%), Ica (32,3%), Ucayali (30,7%), Cusco (30,6%) y Lima (30,5%).

- Las úlceras/lagas genitales fueron referidas en mayor porcentaje por las mujeres solteras con relaciones sexuales (25,1%), las que alcanzaron educación superior (29,3%) y las ubicadas en el quintil superior de riqueza (29,5%). Por área de residencia, en el área urbana (22,6%) y por departamento, en Pasco (27,0%), Provincia Constitucional del Callao (26,4%), Lima (26,4%), Ica (24,3%), Piura (23,8%) y Tumbes (23,2%).
- La inflamación o hinchazón en genitales fue manifestada en mayor porcentaje por mujeres con educación superior (21,6%) y ubicadas en el quintil superior de riqueza (23,9%). Por área de residencia en el área urbana (18,3%) y por departamento en San Martín (36,6%), Ucayali (23,1%), Provincia Constitucional del Callao (22,3%) y Lima (21,6%).
- Aunque no se especifica cuáles son, 15,3% de las mujeres con conocimiento de las ITS refirió que identifican “otros síntomas”.
- Llama la atención que un síntoma evidente como es la secreción o pus por el pene solo fue reconocido por un 3,6% de mujeres, porcentaje que continúa disminuyendo (el 2009 fue de 6,8% y el 2011 4,6%). Las verrugas genitales fueron identificadas como probable ITS por solo el 11,2% de mujeres entrevistadas.

CUADRO N° 11.9
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción mal oliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/ Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/ Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/ Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Grupo de edad															
15-19	4,8	7,0	8,8	8,1	17,7	13,2	17,2	9,8	2,7	15,4	1,2	0,3	2,0	16,5	3 565
20-24	7,2	12,9	15,3	12,3	27,0	18,1	20,7	12,9	3,9	14,3	1,7	0,4	2,6	14,1	3 631
25-29	7,5	16,3	18,9	11,1	26,9	16,6	26,8	13,3	3,4	18,7	1,3	0,9	3,5	17,1	3 766
30-39	7,5	17,5	17,1	12,0	29,4	18,9	21,9	10,7	2,6	17,3	1,7	0,7	4,2	14,6	7 359
40-49	6,8	17,6	19,2	9,9	28,5	18,2	19,0	10,1	3,0	17,0	1,5	0,6	4,3	15,1	5 982
15-24	6,0	10,0	12,1	10,2	22,4	15,7	18,9	11,4	3,3	14,8	1,4	0,3	2,3	15,2	7 196
Estado conyugal															
Soltera	6,4	11,4	14,9	10,1	24,5	16,0	22,0	12,0	3,1	17,1	2,0	0,7	2,5	16,2	7 526
Ha tenido RS	7,6	14,9	19,8	11,9	29,6	18,0	25,1	13,4	2,9	17,0	2,2	1,1	3,2	16,8	4 044
Nunca ha tenido RS	5,1	7,3	9,1	8,1	18,6	13,7	18,3	10,4	3,3	17,2	1,6	0,1	1,6	15,4	3 482
Casada o Conviviente	7,3	16,4	16,7	10,9	27,4	18,2	20,5	10,8	2,9	16,5	1,2	0,5	4,2	14,5	13 655
Divorciada/Separada/Viuda	6,0	18,6	18,8	12,0	29,2	17,3	21,2	10,8	3,5	16,7	1,9	0,9	3,5	16,5	3 121
Nivel de educación															
Sin educación	10,0	4,7	5,7	2,3	9,7	8,8	3,1	2,4	0,3	10,0	1,1	0,6	0,0	7,4	161
Primaria	6,8	9,3	9,1	8,1	16,0	11,2	5,8	3,1	1,1	10,2	0,6	0,3	3,7	12,6	2 719
Secundaria	6,0	11,9	12,1	9,2	22,3	15,1	17,3	8,8	2,4	15,8	1,3	0,3	2,8	13,9	11 003
Superior	7,7	20,2	23,0	13,3	34,4	21,6	29,3	16,0	4,2	19,5	2,0	0,9	4,4	17,6	10 420
Quintil de riqueza															
Quintil inferior	7,8	11,2	9,5	8,8	15,2	10,3	6,3	2,4	1,3	11,5	0,8	0,4	4,4	11,1	2 225
Segundo quintil	7,8	13,4	12,4	10,6	21,9	13,7	14,6	7,3	2,4	14,7	1,1	0,3	4,5	14,0	3 954
Quintil intermedio	6,7	13,9	14,6	10,1	23,2	15,4	17,9	9,9	3,0	18,2	1,2	0,5	3,0	15,7	5 398
Cuarto quintil	5,7	14,5	16,1	11,4	29,9	17,3	24,3	12,5	2,7	17,5	2,4	0,7	3,3	17,7	6 151
Quintil superior	7,2	19,0	23,0	11,5	33,4	23,9	29,5	16,2	4,3	17,7	1,5	0,8	3,4	14,9	6 574
Total 2015	6,9	15,1	16,4	10,8	26,7	17,4	21,1	11,2	3,0	16,7	1,5	0,6	3,6	15,3	24 302
Total 2011	4,6	17,3	14,8	10,3	30,6	21,6	22,4	6,7	1,6	13,9	1,5	0,4	4,6	19,5	14 019

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.10
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción maloliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Área de residencia															
Urbana	6,8	15,7	17,2	11,1	28,0	18,3	22,6	12,2	3,2	17,3	1,6	0,6	3,6	15,9	21 344
Rural	7,0	11,2	10,8	8,7	17,3	10,8	10,0	3,6	1,6	12,3	0,9	0,4	3,6	11,0	2 958
Región natural															
Lima Metropolitana 2/	6,5	15,6	18,9	11,4	31,0	21,8	26,4	14,6	3,6	18,0	1,9	0,6	2,7	16,5	9 372
Resto Costa	4,8	12,3	13,3	8,8	23,2	13,0	20,7	10,7	3,1	16,3	1,2	0,7	2,5	17,5	6 353
Sierra	7,4	13,0	14,5	9,9	22,2	13,1	15,7	8,7	2,6	16,0	1,5	0,6	1,2	11,3	5 154
Selva	11,1	22,1	18,1	14,0	28,3	20,1	15,2	6,3	2,0	14,7	1,1	0,3	11,4	13,7	3 424
Departamento															
Amazonas	10,3	14,4	14,7	8,3	21,7	9,0	14,3	5,5	1,7	10,5	0,2	0,7	2,7	12,8	226
Áncash	6,8	15,1	13,4	11,4	27,1	20,4	22,5	11,9	1,6	14,8	0,7	0,5	1,0	19,9	811
Apurímac	11,1	11,1	12,3	8,1	20,7	9,8	14,3	8,6	1,5	15,2	0,4	0,0	0,8	10,4	223
Arequipa	5,6	16,6	19,2	11,6	27,2	17,6	21,9	14,8	4,8	16,6	4,8	0,5	1,2	11,2	1 330
Ayacucho	4,6	10,8	12,1	7,8	19,4	9,6	16,7	8,6	0,8	16,4	2,2	1,0	1,3	14,3	330
Cajamarca	4,0	18,9	11,7	7,7	25,3	8,3	21,4	2,0	1,5	16,6	0,0	0,5	3,5	7,1	611
Prov. Const. Del Callao	7,5	15,0	12,9	11,3	33,3	22,3	26,4	14,7	2,9	14,6	1,3	0,1	2,7	15,4	909
Cusco	8,6	11,8	22,0	12,5	30,6	17,1	19,0	14,6	5,9	13,5	0,2	0,9	1,0	15,2	706
Huancavelica	22,0	14,6	18,8	15,9	17,9	10,6	10,3	5,7	3,0	26,0	0,5	1,8	0,9	10,9	185
Huánuco	6,4	13,5	14,7	6,5	21,6	16,6	12,6	6,4	1,3	17,3	3,4	0,9	1,4	8,1	520
Ica	3,7	17,9	14,8	12,2	32,3	18,7	24,3	16,7	2,8	14,2	0,9	0,4	6,2	15,1	795
Junín	6,8	14,2	8,8	10,3	22,6	13,5	14,1	9,0	2,9	27,8	1,5	0,4	3,7	19,0	779
La Libertad	3,6	3,9	9,5	8,5	12,1	4,4	10,3	8,8	2,5	14,5	0,5	0,4	1,6	13,2	1 747
Lambayeque	5,3	7,3	10,5	3,5	19,0	11,4	21,4	5,5	1,9	18,4	0,5	0,4	2,2	16,0	873
Lima	6,5	15,6	19,4	11,3	30,5	21,6	26,4	14,4	3,6	18,5	1,9	0,6	2,8	16,8	9 161
Provincia de Lima 3/	6,4	15,7	19,6	11,5	30,8	21,8	26,4	14,6	3,6	18,4	2,0	0,6	2,7	16,6	8 463
Lima Provincias 4/	7,7	14,9	17,2	8,7	27,5	20,0	25,2	12,4	2,9	19,1	0,7	0,2	3,8	18,8	699
Loreto	14,7	24,2	14,4	15,2	19,0	10,3	11,8	4,7	1,3	13,0	0,7	0,1	16,6	15,4	875
Madre de Dios	9,7	23,1	16,4	12,3	20,5	6,1	17,7	9,1	0,9	15,6	0,3	0,9	2,1	2,5	109
Moquegua	3,6	18,3	17,9	8,7	23,1	12,5	18,3	11,3	2,2	14,1	2,6	0,1	0,5	19,2	169
Pasco	7,6	12,8	11,6	13,0	23,8	18,4	27,0	11,9	3,0	23,9	0,0	0,1	1,2	13,4	124
Piura	5,5	16,4	11,9	7,3	24,1	11,3	23,8	8,1	5,2	17,7	1,1	1,6	1,4	24,2	1 329
Puno	9,2	11,1	14,8	12,2	15,1	10,3	6,1	1,9	0,7	11,6	0,1	1,4	0,2	2,9	642
San Martín	7,1	19,9	21,7	13,8	42,2	36,6	15,9	5,5	2,1	10,9	1,7	0,2	14,6	15,3	944
Tacna	3,6	9,9	10,7	7,9	24,2	12,1	17,7	12,5	0,3	9,6	4,4	0,1	1,0	18,0	260
Tumbes	2,3	18,6	14,8	7,1	27,5	15,5	23,2	8,6	1,9	19,8	0,8	0,1	2,9	10,2	189
Ucayali	21,1	36,6	31,9	24,2	30,7	23,1	15,1	8,2	1,7	9,7	0,7	0,2	15,5	8,4	455
Total 2015	6,9	15,1	16,4	10,8	26,7	17,4	21,1	11,2	3,0	16,7	1,5	0,6	3,6	15,3	24 302
Total 2011	4,6	17,3	14,8	10,3	30,6	21,6	22,4	6,7	1,6	13,9	1,5	0,4	4,6	19,5	14 019

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Hurochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.4 PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En particular, a cada mujer entrevistada se le preguntó si en los 12 meses anteriores a la entrevista le diagnosticaron alguna infección de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales. Y a las que tuvieron alguno de esos problemas se les preguntó a quién acudió en búsqueda de consejo o tratamiento.

Prevalencia de ITS

- Entre las mujeres entrevistadas que respondieron haber mantenido relaciones sexuales, un 0,6% informó haber tenido una ITS y/o síntomas asociados, en los 12 meses anteriores a la entrevista (En el año 2011 fue el mismo valor).
- Según características de las mujeres que respondieron haber padecido alguna ITS, el mayor porcentaje aparece en las más jóvenes: 15 a 24 años de edad (1,0%); solteras (0,9%), que pertenecen al cuarto quintil de riqueza (0,9%) y aquellas con educación secundaria (0,8%).
- Los departamentos, que registraron los más altos porcentajes de mujeres con episodios de ITS fueron: Tacna (2,5%), Arequipa (1,1%), San Martín (1,1%), Ucayali (1,1%), Apurímac (1,0%) y Moquegua (1,0%).
- El 13,3% de mujeres declaró haber tenido una ITS o flujo vaginal o úlceras/ llagas genitales. El porcentaje se ha reducido en 0,5 puntos porcentuales, respecto al año 2011 (13,8%). Los mayores porcentajes fueron declarados por mujeres divorciadas/separadas/viudas (16,0%), situadas en el quintil intermedio de riqueza (14,2%) o en el segundo quintil (14,1%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (13,6%), por región natural en la Sierra (16,2%) y por departamento, en Ayacucho (26,8%) Cusco (22,1%), Arequipa (20,1%), Apurímac (16,8%), Huancavelica (15,7%), Junín y Tacna (15,4% en cada caso) y Moquegua (15,3%).

CUADRO N° 11.11
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Informó ITS o sintoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/llagas genitales		
Edad					
15-19	1,0	13,7	3,0	16,5	1 923
20-24	0,9	12,6	1,9	14,5	4 248
25-29	0,5	11,8	1,0	12,8	4 889
30-39	0,6	11,9	2,0	13,4	10 203
40-49	0,4	10,5	2,5	12,1	8 720
15-24	1,0	12,9	2,2	15,1	6 171
Estado conyugal					
Soltera	0,9	11,1	1,7	13,1	5 114
Casada o Conviviente	0,5	11,3	1,9	12,8	20 686
Divorciada/Separada/Viuda	0,5	14,0	2,8	16,0	4 183
Nivel de educación					
Sin educación	0,3	8,7	2,3	10,1	567
Primaria	0,4	11,7	1,9	12,9	6 541
Secundaria	0,8	12,6	2,5	14,7	12 700
Superior	0,4	10,6	1,5	11,9	10 175
Quintil de riqueza					
Quintil inferior	0,4	10,6	1,3	11,5	5 086
Segundo quintil	0,6	12,6	2,3	14,1	5 897
Quintil intermedio	0,5	12,5	2,4	14,2	6 477
Cuarto quintil	0,9	11,4	2,2	13,7	6 366
Quintil superior	0,5	11,1	1,8	12,6	6 158
Total 2015	0,6	11,7	2,0	13,3	29 983
Total 2011	0,6	12,6	1,7	13,8	18 123

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.12
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/lagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/lagas genitales		
Área de residencia					
Urbana	0,6	11,8	2,2	13,6	23 725
Rural	0,3	11,3	1,5	12,2	6 257
Región natural					
Lima Metropolitana 1/	0,6	12,7	2,4	14,7	9 936
Resto Costa	0,5	8,7	1,9	10,1	7 785
Sierra	0,5	14,7	2,1	16,2	7 818
Selva	0,8	9,3	1,1	10,6	4 443
Departamento					
Amazonas	0,1	7,0	0,6	7,4	399
Áncash	0,8	13,2	2,4	15,1	1 087
Apurímac	1,0	15,3	2,5	16,8	426
Arequipa	1,1	17,0	4,7	20,1	1 295
Ayacucho	0,7	25,2	2,4	26,8	547
Cajamarca	0,5	14,3	1,3	15,1	1 523
Prov. Const. Del Callao	0,3	9,6	1,0	10,7	1 073
Cusco	0,7	19,3	2,9	22,1	1 027
Huancavelica	0,5	13,9	2,1	15,7	339
Huánuco	0,9	12,5	1,7	14,3	663
Ica	0,2	5,4	1,0	6,0	862
Junín	0,2	14,3	1,7	15,4	1 106
La Libertad	0,2	7,2	1,5	8,2	1 836
Lambayeque	0,3	7,9	2,2	9,3	1 258
Lima	0,7	13,0	2,6	15,1	9 769
Provincia de Lima 2/	0,7	13,1	2,6	15,2	8 863
Lima Provincias 3/	0,5	12,7	2,6	14,3	906
Loreto	0,4	5,9	0,5	6,5	1 153
Madre de Dios	0,8	7,6	2,9	9,5	145
Moquegua	1,0	13,5	1,4	15,3	179
Pasco	0,1	12,1	0,7	12,4	241
Piura	0,3	6,3	1,3	7,5	1 976
Puno	0,1	13,0	1,3	13,7	1 018
San Martín	1,1	7,1	1,1	8,4	947
Tacna	2,5	12,5	0,8	15,4	317
Tumbes	0,1	9,1	2,4	10,5	262
Ucayali	1,1	5,2	0,6	6,5	532
Total 2015	0,6	11,7	2,0	13,3	29 983
Total 2011	0,6	12,6	1,7	13,8	18 123


1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.3
PERÚ: PREVALENCIA DE ITS Y/O SÍNTOMAS ASOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Fuente de consejo o tratamiento de las ITS

- Entre las mujeres que tuvieron una ITS en los 12 meses anteriores a la entrevista, el 71,6% buscó consejo o tratamiento por un médico y 84,1% los recibió de cualquier fuente, un 9,4% no recibió ni consejo ni tratamiento y 2,9% se auto recetó, es decir, utilizó medicamentos por su cuenta. Otras fuentes mencionadas fueron los curanderos (5,7%) y las farmacias/boticas (24,9%).
- Las entrevistadas que en mayor porcentaje consultaron a un médico fueron las mujeres ubicadas en el quintil superior de riqueza (81,4%), seguido de aquellas con educación superior (76,4%), por edad entre 30 y 39 años (76,2%). Por área de residencia fue mayor en el área urbana (72,9%).
- A la farmacia/botica acudieron en mayor porcentaje las mujeres con educación Primaria (30,3%), las que se ubican en el quintil intermedio de riqueza (31,6%). Por área de residencia, el mayor porcentaje estuvo en la rural (27,2%). Por departamento, en 10 de ellos en un rango que va entre 30,0% y 53,5% de mujeres acudieron a la farmacia/ botica: en Madre de Dios (53,5%), Pasco (44,7%), Huancavelica (40,1%), Huánuco (35,9%), Ancash (34,3%), Junín (33,6%), Loreto (33,5%), Piura (33,3%), La Libertad (31,5%) y Cajamarca (30,6%).

CUADRO N° 11.13
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Edad								
15-19	47,6	5,0	31,8	65,9	7,7	1,5	24,9	318
20-24	69,2	4,3	27,1	83,3	5,2	1,5	10,0	616
25-29	69,8	6,4	21,5	81,3	3,9	3,2	11,6	626
30-39	76,2	4,8	22,6	87,4	1,9	3,4	7,3	1 359
40-49	75,2	7,5	26,4	87,3	3,5	3,2	5,9	1 052
15-24	61,9	4,5	28,7	77,4	6,1	1,5	15,1	934
Estado conyugal								
Soltera	62,4	3,5	27,3	75,4	7,8	1,8	15,1	669
Casada o Conviviente	73,6	6,6	23,6	85,8	2,6	3,3	8,3	2 637
Divorciada/Separada/Viuda	72,7	4,5	27,1	85,8	3,5	2,3	8,3	664
Nivel de educación								
Sin educación	58,5	15,1	26,3	71,9	2,2	5,9	20,0	57
Primaria	62,6	12,8	30,3	82,2	4,4	5,0	8,4	833
Secundaria	72,9	3,9	24,9	84,2	3,3	2,6	9,9	1 869
Superior	76,4	3,2	21,0	85,7	3,8	1,7	8,9	1 211
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	62,8	13,9	28,6	79,2	4,1	4,4	12,4	581
Segundo quintil	67,0	8,2	27,6	82,9	6,0	4,3	6,8	829
Quintil intermedio	69,3	4,8	31,6	83,9	3,0	2,4	10,7	916
Cuarto quintil	75,5	3,1	24,2	85,5	2,7	1,7	10,1	870
Quintil superior	81,4	0,9	11,9	87,5	2,7	2,1	7,7	775
Total 2015	71,6	5,7	24,9	84,1	3,6	2,9	9,4	3 970
Total 2011	66,7	5,6	19,9	78,3	5,5	4,5	11,7	2 501

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.14
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Área de residencia								
Urbana	72,9	4,0	24,3	85,1	3,6	2,4	8,9	3 213
Rural	65,8	12,9	27,2	79,6	3,6	5,0	11,7	757
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	73,8	2,2	21,3	84,2	2,8	1,9	11,1	1 459
Resto Costa	73,4	3,9	25,3	85,4	4,3	1,3	9,0	785
Sierra	66,8	8,9	26,8	81,5	4,1	5,2	9,2	1 257
Selva	74,2	11,1	29,7	88,4	4,0	2,1	5,5	468
Departamento								
Amazonas	73,8	9,0	25,8	86,5	5,5	0,6	7,4	30
Áncash	58,0	10,7	34,3	78,3	4,4	3,9	13,4	164
Apurímac	70,2	4,2	21,9	77,8	4,3	3,1	14,8	72
Arequipa	74,7	1,9	19,2	82,8	5,5	3,1	8,7	259
Ayacucho	73,2	4,3	21,4	82,4	3,2	2,9	11,5	147
Cajamarca	71,3	17,6	30,6	86,6	2,5	1,9	9,0	228
Prov. Const. Del Callao	76,0	9,9	16,8	85,9	3,5	1,4	9,3	113
Cusco	57,9	6,6	29,0	76,9	5,4	5,1	12,7	222
Huancavelica	61,6	8,7	40,1	74,0	9,3	6,4	10,3	53
Huánuco	68,0	13,6	35,9	87,2	2,9	4,9	4,9	95
Ica	68,6	0,0	12,1	78,5	1,4	2,3	17,8	51
Junín	68,5	8,3	33,6	89,2	3,9	3,7	3,2	170
La Libertad	73,2	8,8	31,5	89,3	1,4	0,8	8,6	151
Lambayeque	78,0	2,3	16,2	84,3	5,2	0,9	9,6	117
Lima	74,3	1,8	21,4	84,4	2,8	1,9	10,9	1 476
Provincia de Lima 4/	73,7	1,6	21,7	84,0	2,7	1,9	11,3	1 346
Lima Provincias 5/	81,4	4,3	18,3	87,9	3,7	1,4	7,0	130
Loreto	76,4	12,8	33,5	92,1	3,0	3,0	2,0	75
Madre de Dios	74,3	8,4	53,5	88,3	4,8	2,8	4,1	14
Moquegua	72,6	1,6	17,5	82,3	1,3	1,9	14,5	27
Pasco	71,4	9,8	44,7	91,8	3,1	1,1	4,1	30
Piura	75,4	4,5	33,3	91,2	6,0	1,2	1,6	149
Puno	58,7	16,0	22,1	73,9	3,6	16,1	6,3	139
San Martín	81,9	5,7	26,8	93,3	5,3	0,5	1,0	80
Tacna	62,2	4,3	11,7	73,1	4,9	2,5	19,5	49
Tumbes	85,4	0,5	24,2	92,7	1,8	4,1	1,4	27
Ucayali	80,8	7,3	19,9	88,8	5,5	0,0	5,7	34
Total 2015	71,6	5,7	24,9	84,1	3,6	2,9	9,4	3970
Total 2011	66,7	5,6	19,9	78,3	5,5	4,5	11,7	2 501

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la Encuesta 2015, se preguntó a las mujeres acerca de sus relaciones sexuales en los últimos 12 meses, así como por el

número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes para la obtención del condón. Asimismo se indagó acerca del nivel de conocimiento de la mujer respecto a la persona con quien mantuvo contacto sexual, para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no.

Número de parejas sexuales de las mujeres no unidas

- La distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista muestra que el 65,1% refirió no haber tenido pareja sexual (69,6% en el año 2011), 32,6% respondió haber tenido una pareja (28,4% en el año 2011), y 2,3% tuvo dos o más parejas (2,0% en el año 2011).
- Las mujeres no unidas sin nivel de educación respondieron en mayor porcentaje no haber tenido pareja sexual (87,0%), seguido de aquellas de 15 a 19 años de edad (81,1%) y las del quintil inferior de riqueza (82,2%).
- En el área rural se encontró un mayor porcentaje de mujeres no unidas que respondieron no haber tenido pareja sexual en los últimos 12 meses (80,9%). Por departamento, en 10 de ellos el 70% o más de mujeres no unidas (ni casadas ni convivientes) o no tuvieron pareja sexual en ese tiempo de referencia: Puno (83,7%), Huancavelica (82,6%), Cusco (76,0%), Huánuco y Pasco (75,7% en cada uno), Cajamarca (74,8%), Junín (74,2%), Apurímac (73,8%), Ancash (71,5%) y Amazonas (70,1%).

CUADRO N° 11.15
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Edad						
15-19	100,0	81,1	16,5	2,4	0,2	5 315
20-24	100,0	51,3	45,2	3,5	0,5	3 035
25-29	100,0	48,4	48,7	2,9	0,6	1 865
30-39	100,0	58,6	39,8	1,6	0,4	2 506
40-49	100,0	67,1	31,9	1,0	0,3	2 360
15-24	100,0	70,3	27,0	2,8	0,3	8 350
Estado conyugal						
Soltera	100,0	67,0	30,7	2,3	0,4	10 897
Soltera ha tenido RS	100,0	29,7	65,5	4,9	0,8	5 114
Soltera no ha tenido RS	100,0	100,0	n.a.	n.a.	n.a.	5 783
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	60,3	37,3	2,4	0,4	4 183
Nivel de educación						
Sin educación	100,0	87,0	12,9	0,1	0,2	142
Primaria	100,0	76,1	23,0	0,9	0,2	1 515
Secundaria	100,0	73,6	24,5	1,9	0,3	7 783
Superior	100,0	49,9	46,7	3,4	0,5	5 640
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	100,0	82,2	17,2	0,7	0,2	1 866
Segundo quintil	100,0	70,1	27,9	2,1	0,3	2 472
Quintil intermedio	100,0	61,2	36,4	2,3	0,4	3 288
Cuarto quintil	100,0	63,5	34,2	2,3	0,4	3 742
Quintil superior	100,0	58,4	38,3	3,3	0,5	3 712
Total 2015	100,0	65,1	32,6	2,3	0,4	15 080
Total 2011	100,0	69,6	28,4	2,0	0,3	9 844

na= No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.16
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Área de residencia						
Urbana	100,0	62,4	35,1	2,6	0,4	12 833
Rural	100,0	80,9	18,1	1,0	0,2	2 248
Región natural						
Lima Metropolitana 1/	100,0	59,5	37,4	3,0	0,5	5 698
Resto Costa	100,0	64,4	33,7	1,9	0,4	3 983
Sierra	100,0	76,2	22,6	1,1	0,2	3 831
Selva	100,0	60,3	36,1	3,6	0,4	1 568
Departamento						
Amazonas	100,0	70,1	28,8	1,1	0,4	145
Áncash	100,0	71,5	27,8	0,7	0,3	563
Apurímac	100,0	73,8	25,7	0,6	0,3	181
Arequipa	100,0	63,9	33,3	2,8	0,4	764
Ayacucho	100,0	67,9	30,2	1,9	0,3	244
Cajamarca	100,0	74,8	23,5	1,7	0,3	633
Prov. Const. Del Callao	100,0	62,6	35,2	2,1	0,4	584
Cusco	100,0	76,0	22,7	1,2	0,3	481
Huancavelica	100,0	82,6	17,3	0,1	0,2	161
Huánuco	100,0	75,7	23,6	0,8	0,3	346
Ica	100,0	61,7	37,0	1,3	0,4	411
Junín	100,0	74,2	25,4	0,4	0,3	534
La Libertad	100,0	67,3	31,4	1,3	0,3	959
Lambayeque	100,0	68,3	31,1	0,6	0,3	697
Lima	100,0	59,2	37,7	3,1	0,5	5 540
Provincia de Lima 2/	100,0	59,2	37,7	3,1	0,5	5 114
Lima Provincias 3/	100,0	59,4	37,4	3,2	0,4	426
Loreto	100,0	55,6	41,3	3,2	0,5	376
Madre de Dios	100,0	56,3	40,4	3,3	0,5	50
Moquegua	100,0	67,2	30,8	2,0	0,3	89
Pasco	100,0	75,7	23,6	0,7	0,2	109
Piura	100,0	67,6	29,4	3,0	0,4	970
Puno	100,0	83,7	15,6	0,7	0,2	485
San Martín	100,0	54,2	38,3	7,5	0,5	288
Tacna	100,0	66,9	30,3	2,8	0,4	168
Tumbes	100,0	66,2	32,1	1,7	0,4	101
Ucayali	100,0	51,8	43,0	5,2	0,5	201
Total 2015	100,0	65,1	32,6	2,3	0,4	15 080
Total 2011	100,0	69,6	28,4	2,0	0,3	9 844

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

