

8. SALUD MATERNA



8. SALUD MATERNA



La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar contiene información sobre aspectos relacionados con la salud materna referidos a temas tales como la atención prenatal, la asistencia durante el parto y el cuidado postparto. El objetivo básico es identificar a los grupos más vulnerables para así contribuir en la planificación de los programas de salud materna.

La cobertura y calidad de la atención prenatal, durante y después del parto, constituyen factores estrechamente ligados a la salud materno-infantil y son, por lo tanto, elementos que deben ser tomados en cuenta al evaluar la situación general de salud del país.

8.1 ATENCIÓN PRENATAL

El control médico durante el embarazo es muy importante para la salud de la madre y de la hija y/o hijo. Durante el control, la mujer embarazada es examinada y se le toman varias pruebas para detectar situaciones (ejemplo: presión alta, anemia, entre otras) que pueden poner en peligro su salud y el desarrollo normal del embarazo. Además, durante las visitas se vacuna a la madre con toxoide tetánico para evitar el tétano neonatal. También se le aconseja acerca de cómo alimentarse durante el embarazo, los síntomas y signos de posibles complicaciones del parto y cómo cuidar y alimentar al recién nacido o nacida. En muchos de los controles prenatales, también se orienta a la madre sobre los temas de planificación familiar.

Atención prenatal por fuente de atención

- El 97,0% de las mujeres tuvieron algún control prenatal por personal de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera), lo que constituyó un aumento sobre el 95,4% encontrado en el año 2011. Desagregando este indicador, se observaron avances entre los años 2011 y 2015 donde subió la atención por médico, de 32,9% a 36,9%. La atención prenatal por obstetrix presenta una tendencia a disminuir, de 57,5% en el año 2011 a 56,4% en el año 2015.
- Las diferencias de atención prenatal se evidencian según características demográficas y sociales de la mujer. Así, el 22,8% de menores de 20 años de edad se atendieron con un médico, en comparación con el 44,6% de las mujeres de 35 a 49 años de edad. El 66,6% de las menores de 20 años de edad se controlaron con una obstetrix.
- Según el orden de nacimiento, una mayor proporción de mujeres fueron atendidas por médico en su primer nacimiento (40,1%) comparado con el sexto o posterior nacimiento (18,4%).

- En cuanto al nivel de educación de las mujeres entrevistadas, el 59,1% con educación superior se controlaron con un médico, cifra mayor a la registrada en aquellas con educación primaria (18,5%) y sin educación (18,7%).
- Con relación a la capacidad adquisitiva, la diferencia entre el quintil superior y el quintil inferior de riqueza para la atención médica va de 73,2% a 13,9% en el año 2015. En el caso de la atención por obstetriz, se invierte el patrón entre los dos quintiles, siendo la diferencia entre el quintil inferior y el superior de 64,0% frente a 26,4%.

CUADRO N° 8.1
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON NACIMIENTOS EN LOS CINCO AÑOS QUE
PRECEDIERON LA ENCUESTA, POR PERSONA QUE PROPORCIONÓ EL CUIDADO PRENATAL PARA
EL ÚLTIMO NACIMIENTO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Persona que proporcionó la atención prenatal					Otro	No recibió atención prenatal	Porcentaje que recibió atención prenatal de proveedor de salud calificado 1/	Número de mujeres
		Médico	Obstetriz	Enfermera	Técnico en enfermería/ Promotor de salud	Comadrona/ Partera				
Edad de la madre al nacimiento										
Menos de 20 años	100,0	22,8	66,6	5,5	3,1	0,0	0,0	2,0	94,9	1 411
20-34	100,0	37,2	56,8	3,4	1,5	0,0	0,0	1,1	97,4	7 506
35-49	100,0	44,6	48,8	3,9	1,1	0,1	0,0	1,6	97,2	2 221
Orden de nacimiento										
Primer nacimiento	100,0	40,1	54,6	2,9	1,4	0,0	0,0	1,0	97,6	3 568
2-3	100,0	39,1	55,8	3,1	1,3	0,0	0,0	0,6	98,0	5 495
4-5	100,0	28,1	62,3	5,2	2,3	0,1	0,0	1,9	95,7	1 483
6 y más	100,0	18,4	57,9	11,4	4,9	0,0	0,0	7,4	87,7	593
Nivel de educación										
Sin educación	100,0	18,7	57,6	12,2	4,5	0,0	0,0	7,0	88,4	180
Primaria	100,0	18,5	64,4	9,5	4,6	0,1	0,0	2,9	92,5	2 398
Secundaria	100,0	31,5	63,4	2,9	1,1	0,0	0,0	1,0	97,8	5 190
Superior	100,0	59,1	40,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,2	99,6	3 371
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	100,0	13,9	64,0	12,0	6,7	0,0	0,0	3,5	89,8	2 393
Segundo quintil	100,0	24,4	70,3	3,4	0,7	0,0	0,0	1,2	98,1	2 489
Quintil intermedio	100,0	33,9	63,8	1,5	0,1	0,0	0,0	0,7	99,1	2 336
Cuarto quintil	100,0	48,8	49,9	0,5	0,1	0,0	0,1	0,5	99,2	2 037
Quintil superior	100,0	73,2	26,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	99,9	1 883
Total 2015	100,0	36,9	56,4	3,8	1,6	0,0	0,0	1,3	97,0	11 138
Total 2011	100,0	32,9	57,5	4,9	2,9	0,1	0,0	1,6	95,4	7 053

Nota: Si se mencionó más de una fuente de atención prenatal, solo es considerada la más calificada.

1/ Profesional de salud calificado: incluye médico, obstetriz y enfermera.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Según ámbito geográfico, más mujeres fueron atendidas por médico en el área urbana (43,6%) que en la rural (17,1%). En cambio, la atención por obstetriz y enfermera es mayor en el área rural (63,5% y 10,7%, respectivamente).
- Por región natural, la atención por médico fue alta en Lima Metropolitana (55,1%) y Resto Costa (40,2%), a diferencia de la Sierra (64,5%) y la Selva (63,9%) que muestran mayores porcentajes de atención por obstetriz.

- En el departamento de Moquegua (56,2%), Lima (54,3%), la Provincia Constitucional del Callao (53,2%) e Ica (47,2%), se observa que la atención prenatal por médico fue superior al promedio nacional (36,9%). En cambio, en los departamentos de Huánuco, Ucayali, Lambayeque y Tumbes más del 75,0% de mujeres fueron atendidas por obstetriz.

CUADRO N° 8.2
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON NACIMIENTOS EN
LOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, POR PERSONA QUE PROPORCIONÓ
EL CUIDADO PRENATAL PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Persona que proporcionó la atención prenatal					Otro	No recibió atención prenatal	Porcentaje que recibió atención prenatal de proveedor de salud calificado 1/	Número de mujeres
		Médico	Obstetriz	Enfermera	Técnico en enfermería/ Promotor de salud	Comadrona/ Partera				
Área de residencia										
Urbana	100,0	43,6	54,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,7	99,0	8 294
Rural	100,0	17,1	63,5	10,7	5,7	0,0	0,0	3,0	91,3	2 844
Región natural										
Lima Metropolitana 2/	100,0	55,1	43,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	99,7	3 256
Resto Costa	100,0	40,2	57,1	1,7	0,2	0,1	0,1	0,7	99,0	2 959
Sierra	100,0	25,2	64,5	7,7	1,4	0,0	0,0	1,2	97,4	3 011
Selva	100,0	19,0	63,9	6,0	7,0	0,0	0,0	4,0	89,0	1 912
Departamento										
Amazonas	100,0	26,6	52,4	8,5	8,6	0,0	0,0	3,9	87,4	174
Áncash	100,0	31,5	58,3	8,7	0,9	0,0	0,0	0,6	98,4	398
Apurímac	100,0	20,1	73,2	6,1	0,3	0,0	0,0	0,3	99,4	167
Arequipa	100,0	41,7	55,5	1,7	0,0	0,0	0,0	1,1	98,9	407
Ayacucho	100,0	14,4	72,3	9,5	3,2	0,0	0,0	0,7	96,1	201
Cajamarca	100,0	28,2	51,1	14,4	5,0	0,0	0,0	1,2	93,8	598
Prov. Const. del Callao	100,0	53,2	46,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	99,5	377
Cusco	100,0	27,6	66,9	4,7	0,0	0,1	0,0	0,7	99,2	423
Huancavelica	100,0	16,3	74,5	6,7	1,2	0,0	0,0	1,3	97,5	148
Huánuco	100,0	10,9	80,9	6,9	0,5	0,0	0,0	0,8	98,7	267
Ica	100,0	47,2	51,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,9	99,0	361
Junín	100,0	22,2	70,1	4,2	2,1	0,0	0,0	1,4	96,5	409
La Libertad	100,0	41,1	53,3	3,2	0,1	0,0	0,3	2,0	97,6	719
Lambayeque	100,0	21,1	76,8	1,5	0,2	0,1	0,0	0,3	99,4	444
Lima	100,0	54,3	44,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,4	99,6	3 274
Provincia de Lima 3/	100,0	55,4	43,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	99,7	2 879
Lima Provincias 4/	100,0	47,0	51,0	0,9	0,0	0,1	0,0	0,9	98,9	396
Loreto	100,0	13,1	58,0	7,2	14,3	0,0	0,0	7,5	78,2	562
Madre de Dios	100,0	31,4	58,2	7,5	1,3	0,0	0,0	1,6	97,0	67
Moquegua	100,0	56,2	41,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,4	99,6	60
Pasco	100,0	34,3	51,4	10,0	2,7	0,0	0,0	1,6	95,7	110
Piura	100,0	40,4	56,5	2,3	0,3	0,1	0,0	0,4	99,2	785
Puno	100,0	18,4	71,4	8,2	0,9	0,0	0,0	1,1	97,9	356
San Martín	100,0	24,8	67,9	1,1	5,2	0,0	0,0	1,0	93,8	369
Tacna	100,0	38,1	57,9	3,2	0,0	0,0	0,1	0,6	99,2	111
Tumbes	100,0	23,8	75,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	99,4	104
Ucayali	100,0	9,9	77,5	3,8	1,6	0,0	0,2	7,0	91,2	245
Total 2015	100,0	36,9	56,4	3,8	1,6	0,0	0,0	1,3	97,0	11 138
Total 2011	100,0	32,9	57,5	4,9	2,9	0,1	0,0	1,6	95,4	7 053

Nota: Si se mencionó más de una fuente de atención prenatal, solo es considerada la más calificada.

1/ Profesional de salud calificado: incluye médico, obstetriz y enfermera.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Número de visitas de atención prenatal

- El 88,4% de los últimos nacimientos ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta recibieron seis y más visitas de atención prenatal. Este porcentaje fue mayor a lo encontrado en el año 2011 (83,5%). La cobertura de visitas en el área urbana alcanzó el 89,8% y en el área rural (84,5%).
- Es importante que la primera visita de atención prenatal se realice tempranamente, para detectar situaciones que podrían llevar a mayor riesgo durante periodos posteriores del embarazo y en el parto. El 79,8% de las mujeres tuvieron su primera atención en los primeros tres meses de embarazo. Los porcentajes difieren si se trata de mujeres que residían en el área urbana (82,5%) o rural (72,1%).
- Existe una diferencia de cerca de medio mes entre las medianas de meses de embarazo a la primera visita entre el área urbana y rural (2,6 y 3,0 meses, respectivamente).


CUADRO Nº 8.3
PERÚ: NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL PRENATAL Y MESES DE EMBARAZO A LA PRIMERA VISITA PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LAS MUJERES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POR ÁREA DE RESIDENCIA, 2015
 (Distribución porcentual)

Número y momento de visitas de atención prenatal	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
Número de visitas de control prenatal			
Ninguna	1,3	0,7	3,0
1	0,3	0,3	0,5
2-3	2,6	2,4	3,3
4-5	7,2	6,7	8,7
6 y más	88,4	89,8	84,5
No sabe/ sin información	0,1	0,2	0,0
Total	100,0	100,0	100,0
Meses de embarazo a la primera visita de control prenatal			
1 - 3	1,3	0,7	3,0
4-5	79,8	82,5	72,1
6-7	14,2	12,9	17,9
8 y más	4,1	3,4	6,0
8 y más	0,6	0,5	1,1
Total	100,0	100,0	100,0
Número de mujeres	11 138	8 294	2 844
Mediana de meses de embarazo a la primera visita para atención prenatal	2,7	2,6	3,0
Número de mujeres con atención prenatal	10 996	8 236	2 760

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO Nº 8.1
PERÚ: NÚMERO DE VISITAS DE CONTROL PRENATAL Y MESES DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL, POR ÁREA DE RESIDENCIA, 2015
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Contenido de la atención prenatal

- Los controles de rutina más frecuentes en la atención prenatal son el control de peso (99,7%), la presión arterial (99,6%) y la altura uterina (99,4%), los que fueron realizados a casi todas las mujeres que recibieron la atención. Estos porcentajes en el año 2011 representaron el 99,4% para el control de peso y, 99,3% para la presión arterial y la altura uterina, en cada caso.
- La explicación de las complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo fue realizada en el 93,9% de las mujeres, mayor en 3,0 puntos porcentuales a lo registrado en el año 2011 (90,9%). Las mujeres ubicadas en el quintil superior de riqueza (95,4%), con educación superior (95,3%) y aquellas del segundo quintil (94,8%) muestran los más altos porcentajes.
- La toma de muestras de orina durante la atención prenatal permite descartar alguna infección o enfermedad diabética o hipertensiva del embarazo. De otro lado, una muestra de sangre ayuda a evaluar si la embarazada presenta anemia, lo que puede ser riesgoso para el parto o postparto. Según resultados de la Encuesta 2015, estos dos análisis se realizaron, al 95,3% (orina) y 96,0% (sangre) de mujeres, porcentajes que son más altos respecto al año 2011 (88,9% y 90,3%, respectivamente). Cabe destacar que en el país, la cobertura de atención prenatal casi es universal, sin embargo, aún existen niveles por debajo del promedio nacional; por ejemplo, de análisis de orina realizado en el 88,3% de mujeres sin educación y 88,4% entre aquellas del quintil inferior de riqueza. Con respecto a la muestra de sangre, estas se tomaron al 89,6% de mujeres ubicadas en el quintil inferior y 90,3% de aquellas sin educación.

CUADRO N° 8.4
PERÚ: ATENCIÓN PRENATAL PARA MUJERES CON HIJAS Y/O HIJOS NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ,
POR CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Mujeres que durante el embarazo del último nacimiento:			Entre las mujeres que recibieron atención prenatal contenido de la atención para el último nacimiento:						Número de mujeres con atención prenatal
	Recibió pastillas/ jarabe de hierro	Tomó medicamento para parásitos intestinales	Mujeres con un nacimiento en los últimos cinco años	Le explicaron síntomas de complicaciones del embarazo	La pesaron	Tomaron la presión arterial	Tomaron muestra de orina	Tomaron muestra de sangre	Midieron la barriga	
Edad de la madre al nacimiento										
Menos de 20 años	87,8	4,6	1 411	93,0	99,7	99,4	93,8	94,7	99,3	1 383
20-34	90,2	3,1	7 506	94,0	99,7	99,7	95,5	96,1	99,6	7 426
35-49	90,8	3,1	2 221	94,1	99,5	99,4	95,6	96,4	99,1	2 186
Orden de nacimiento										
Primer nacimiento	90,8	3,2	3 568	93,6	99,8	99,6	96,0	96,9	99,2	3 531
2-3	90,7	2,8	5 495	94,2	99,7	99,7	95,8	96,3	99,6	5 461
4-5	88,2	4,0	1 483	93,5	99,4	99,4	94,0	94,4	99,4	1 454
6 y más	84,1	6,9	593	93,4	99,6	99,5	89,3	91,3	99,4	549
Nivel de educación										
Sin educación	79,2	7,3	180	89,3	99,7	100,0	88,3	90,3	100,0	168
Primaria	87,5	4,7	2 398	92,4	99,3	99,4	91,1	91,9	99,4	2 329
Secundaria	90,1	3,0	5 190	93,8	99,8	99,5	95,7	96,2	99,5	5 136
Superior	92,4	2,6	3 371	95,3	99,8	99,8	97,9	98,7	99,2	3 364
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	87,0	5,4	2 393	92,4	99,4	99,4	88,4	89,6	99,4	2 309
Segundo quintil	89,0	3,4	2 489	94,8	99,7	99,8	96,1	96,2	99,6	2 459
Quintil intermedio	91,1	2,9	2 336	93,5	99,7	99,6	96,4	97,4	99,4	2 320
Cuarto quintil	92,0	2,8	2 037	93,6	99,7	99,4	98,1	98,5	99,4	2 027
Quintil superior	91,8	1,6	1 883	95,4	99,9	99,7	98,4	99,0	99,2	1 881
Total 2015	90,0	3,3	11 138	93,9	99,7	99,6	95,3	96,0	99,4	10 996
Total 2011	86,5	2,6	7 053	90,9	99,4	99,3	88,9	90,3	99,3	6 937

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Por ámbito geográfico, los mayores porcentajes de mujeres a quienes le explicaron síntomas de complicaciones del embarazo se registraron en la Selva y en el área urbana (94,7% y 94,2%, respectivamente). A nivel departamental, en 14 de ellos, los porcentajes fueron superiores al promedio nacional (93,9%) destacando Apurímac, San Martín, Ucayali, Junín y Ayacucho con más del 96,0%. En cambio, Madre de Dios (88,5%) y Áncash (89,3%) presentaron los menores porcentajes.
- La muestra de orina fue realizada en menor proporción en el área rural (89,8%) y en la región Selva (92,4%); asimismo, en los departamentos de Amazonas (86,6%) y Loreto (88,8%).

CUADRO N° 8.5
PERÚ: ATENCIÓN PRENATAL PARA MUJERES CON HIJAS Y/O HIJOS NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS,
POR CONTENIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Mujeres que durante el embarazo del último nacimiento:			Entre las mujeres que recibieron atención prenatal contenido de la atención para el último nacimiento:						Número de mujeres con atención prenatal
	Recibió pastillas/jarabe de hierro	Tomó medicamento para parásitos intestinales	Mujeres con un nacimiento en los últimos cinco años	Le explicaron síntomas de complicaciones del embarazo	La pesaron	Tomaron la presión arterial	Tomaron muestra de orina	Tomaron muestra de la barriga	Midieron de la barriga	
Área de residencia										
Urbana	91,0	2,9	8 294	94,2	99,7	99,6	97,1	97,7	99,4	8 236
Rural	87,2	4,5	2 844	93,1	99,6	99,5	89,8	90,8	99,6	2 760
Región natural										
Lima Metropolitana 1/	93,0	1,8	3 256	93,4	99,8	99,5	97,9	99,1	99,3	3 246
Resto Costa	92,6	3,2	2 959	93,8	99,6	99,6	96,7	97,4	99,3	2 940
Sierra	85,7	2,8	3 011	94,0	99,5	99,7	92,8	93,2	99,6	2 975
Selva	87,9	6,9	1 912	94,7	99,8	99,5	92,4	92,5	99,6	1 835
Departamento										
Amazonas	86,2	3,7	174	90,0	99,3	98,5	86,6	86,4	99,4	168
Áncash	88,6	4,5	398	89,3	99,4	99,4	89,9	91,5	99,9	395
Apurímac	93,1	0,5	167	98,6	99,6	99,8	98,2	98,1	99,8	167
Arequipa	86,7	1,7	407	90,9	100,0	99,8	94,7	97,0	99,3	402
Ayacucho	92,0	3,4	201	96,5	99,8	99,9	92,8	92,2	99,5	200
Cajamarca	90,3	4,2	598	93,6	99,6	99,3	90,3	89,6	99,3	591
Prov. Const. del Callao	91,7	1,4	377	93,7	99,9	99,9	98,2	99,3	99,3	375
Cusco	85,8	2,9	423	94,9	100,0	100,0	95,8	95,0	100,0	421
Huancavelica	84,2	4,3	148	96,0	99,6	99,6	93,1	96,0	99,6	146
Huánuco	90,1	5,1	267	95,6	100,0	99,9	96,7	98,4	99,6	265
Ica	93,4	3,2	361	92,8	99,6	99,9	98,7	99,0	99,9	358
Junín	85,0	2,7	409	96,7	99,9	100,0	96,8	96,5	99,9	403
La Libertad	91,8	2,3	719	95,9	99,4	99,6	94,2	94,6	99,1	705
Lambayeque	91,5	4,3	444	95,0	99,7	99,8	97,7	97,7	99,0	443
Lima	92,6	2,0	3 274	93,4	99,7	99,5	97,8	98,9	99,3	3 262
Provincia de Lima 2/	93,1	1,8	2 879	93,3	99,8	99,5	97,8	99,1	99,3	2 870
Lima Provincias 3/	88,7	3,1	396	94,2	99,3	99,6	97,5	98,2	99,3	392
Loreto	86,2	11,0	562	93,1	99,8	99,2	88,8	89,4	99,7	520
Madre de Dios	80,7	3,6	67	88,5	99,6	99,7	96,3	96,5	99,4	66
Moquegua	75,4	1,6	60	93,8	99,7	99,5	96,3	97,5	99,9	60
Pasco	92,7	2,6	110	95,6	99,0	99,6	96,0	96,5	99,4	108
Piura	96,0	3,8	785	91,0	99,5	99,3	93,6	94,4	99,1	782
Puno	69,6	2,4	356	95,0	99,0	99,6	92,1	91,6	99,4	352
San Martín	93,2	6,8	369	98,0	99,9	99,8	97,0	97,5	99,6	365
Tacna	84,2	0,3	111	94,9	99,7	99,8	97,1	97,5	99,6	110
Tumbes	96,9	3,2	104	95,4	100,0	99,9	98,2	99,6	99,9	103
Ucayali	85,4	3,5	245	97,6	99,8	99,6	93,2	94,4	99,4	228
Total 2015	90,0	3,3	11 138	93,9	99,7	99,6	95,3	96,0	99,4	10 996
Total 2011	86,5	2,6	7 053	90,9	99,4	99,3	88,9	90,3	99,3	6 937

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Vacunación antitetánica durante la gestación

Las condiciones de higiene e inmunización que rodean al parto, sobre todo en lo que se refiere a los instrumentos utilizados para el corte del cordón umbilical, hacen que en el Perú sea necesaria la aplicación de la vacuna antitetánica durante la gestación, para prevenir que la niña o el niño recién nacido pueda contraer el tétano neonatal.

- En la Encuesta 2015, se muestra que el 57,9% de mujeres con una nacida o nacido vivo en los últimos cinco años anteriores a la encuesta recibieron dos o más dosis de la vacuna antitetánica. Este porcentaje es mayor en comparación al valor encontrado en el año 2011 (56,5%). El porcentaje de mujeres cuyo parto más reciente fue protegido contra el tétano alcanzó el 79,2%.
- Los diferenciales según características de la mujer fueron notorios por quintil de riqueza y educación de la madre. Así, las mujeres ubicadas en el quintil superior recibieron dos o más inyecciones en un 46,7%, en comparación con el 58,7% de aquellas del quintil inferior. El 52,2% de madres con educación superior y el 58,4% de aquellas sin educación fueron inmunizadas.

CUADRO N° 8.6
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON VACUNAS
CONTRA EL TÉTANO NEONATAL EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON
LA ENCUESTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Mujeres que recibieron dos o más inyecciones contra el tétano durante último embarazo	Mujeres cuyo último nacimiento fue protegido contra el tétano 1/	Número de madres
Edad de la madre al nacimiento			
Menos de 20 años	61,2	79,5	1 411
20-34	58,1	79,5	7 506
35-49	55,4	77,9	2 221
Orden de nacimiento			
Primer nacimiento	58,7	76,3	3 568
2-3	57,2	80,0	5 494
4-5	58,4	82,7	1 483
6 y más	59,1	80,3	593
Nivel de educación			
Sin educación	58,4	74,5	180
Primaria	59,6	78,7	2 398
Secundaria	60,9	82,0	5 190
Superior	52,2	75,5	3 371
Quintil de riqueza			
Quintil inferior	58,7	79,4	2 393
Segundo quintil	61,0	82,6	2 489
Quintil intermedio	63,0	82,3	2 336
Cuarto quintil	57,9	81,0	2 037
Quintil superior	46,7	68,6	1 883
Total 2015	57,9	79,2	11 138
Total 2011	56,5	82,6	7 053

1/ Incluye madres que recibieron dos o más inyecciones durante el embarazo del nacimiento más reciente, o dos o más inyecciones (la última dosis en los tres años antes del nacimiento más reciente), o tres o más inyecciones (la última dosis en los cinco años antes del nacimiento más reciente), o cuatro o más inyecciones (la última dosis en los 10 años antes del nacimiento más reciente), o cinco o más inyecciones antes del nacimiento más reciente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Según ámbito geográfico, en la Sierra (49,1%) y en el área rural (57,3%) se presentaron los menores porcentajes de mujeres que recibieron dos o más inyecciones. Por departamento, hay algunos con bajos porcentajes con un mínimo de dos dosis, como Tacna (28,6%), Madre de Dios (31,9%) y Moquegua (33,7%). Sin embargo, este último departamento tuvo una alta tasa de protección contra el tétano (70,1%). En cambio Madre de Dios, muestra un menor nivel de protección contra el tétano (55,9%).

CUADRO N° 8.7
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON VACUNAS CONTRA EL TÉTANO NEONATAL
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Mujeres que recibieron dos o más inyecciones contra el tétano durante último embarazo	Mujeres cuyo último nacimiento fue protegido contra el tétano 1/	Número de madres
Área de residencia			
Urbana	58,1	79,1	8 294
Rural	57,3	79,3	2 844
Región natural			
Lima Metropolitana 2/	56,3	77,6	3 256
Resto Costa	63,4	82,9	2 959
Sierra	49,1	73,2	3 011
Selva	66,1	85,5	1 912
Departamento			
Amazonas	57,5	74,8	174
Áncash	51,0	75,2	398
Apurímac	56,2	88,4	167
Arequipa	34,2	63,4	407
Ayacucho	54,1	76,8	201
Cajamarca	63,3	81,6	598
Prov. Const. del Callao	65,3	81,9	377
Cusco	36,3	67,2	423
Huancavelica	51,6	84,0	148
Huánuco	58,3	84,5	267
Ica	66,5	83,5	361
Junín	60,5	82,1	409
La Libertad	59,6	78,1	719
Lambayeque	73,1	86,6	444
Lima	56,0	77,6	3 274
Provincia de Lima 3/	55,1	77,0	2 879
Lima Provincias 4/	62,1	81,7	396
Loreto	68,6	88,3	562
Madre de Dios	31,9	55,9	67
Moquegua	33,7	70,1	60
Pasco	71,6	87,9	110
Piura	67,6	86,7	785
Puno	42,8	58,2	356
San Martín	67,9	90,6	369
Tacna	28,6	66,3	111
Tumbes	58,4	86,9	104
Ucayali	77,8	87,9	245
Total 2015	57,9	79,2	11 138
Total 2011	56,5	82,6	7 053

1/ Incluye madres que recibieron dos o más inyecciones durante el embarazo del nacimiento más reciente, o dos o más inyecciones (la última dosis en los tres años antes del nacimiento más reciente), o tres o más inyecciones (la última dosis en los cinco años antes del nacimiento más reciente), o cuatro o más inyecciones (la última dosis en los 10 años antes del nacimiento más reciente), o cinco o más inyecciones antes del nacimiento más reciente.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


8.2 ATENCIÓN DEL PARTO

El lugar y tipo de atención del parto son importantes para asegurar la salud de la madre y niña o niño por nacer, asimismo, para determinar el acceso de la población a un servicio de atención de emergencia obstétrica en caso de alguna complicación.

Parto institucional

Es aquel parto atendido en un establecimiento de salud (público o privado) por personal de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera), en el cual se estima hay menos riesgo, tanto para la madre como para el recién nacido que con uno domiciliario.

- En la Encuesta 2015, la proporción de partos atendidos en establecimientos de salud por personal de salud calificado fue 90,7%, mayor en 6,4 puntos porcentuales respecto a lo observado en el año 2011 (84,3%). Desagregando este indicador, se aprecia que el 92,9% de los partos fueron atendidos por profesional de salud calificado y el 91,0% de ellos se atendieron en establecimientos de salud (público o privado).
- Según característica seleccionada, la cobertura de partos institucionales fue mayor entre las mujeres con cuatro y más visitas de control prenatal en comparación con aquellas sin ninguna visita (91,7% frente a 36,3%). Asimismo, entre las madres ubicadas en el quintil superior (98,6%) en relación con aquellas del quintil inferior de riqueza (68,6%), y entre mujeres con educación superior y aquellas sin educación (98,2% frente a 71,8%).



CUADRO N° 8.8
PERÚ: PARTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PARTOS ATENDIDOS POR PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO Y PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Partos en establecimientos de salud 1/	Partos atendidos por profesional de salud calificado 2/	Parto institucional 3/	Número de nacimientos
Edad de la madre al nacimiento				
Menos de 20 años	89,4	91,4	88,9	1 411
20-34	91,1	93,2	90,8	7 506
35-49	91,6	93,1	91,2	2 221
Orden de nacimiento				
Primer nacimiento	95,0	96,5	94,7	3 568
2-3	92,4	94,4	92,2	5 495
4-5	84,3	86,9	83,8	1 483
6 y más	70,4	72,7	69,4	593
Nivel de educación				
Sin educación	72,6	75,4	71,8	180
Primaria	76,6	80,0	75,8	2 398
Secundaria	93,6	95,3	93,3	5 190
Superior	98,3	99,3	98,2	3 371
Visitas para control prenatal				
Ninguna	38,2	40,4	36,3	142
1-3 visitas	79,5	81,5	79,0	326
4 y más visitas	92,1	94,0	91,7	10 656
No sabe/ sin información	(97,4)	(98,6)	(97,4)	14
Quintil de riqueza				
Quintil inferior	69,8	73,7	68,6	2 393
Segundo quintil	93,6	95,7	93,4	2 489
Quintil intermedio	97,5	98,6	97,5	2 336
Cuarto quintil	98,2	99,3	98,1	2 037
Quintil superior	98,7	99,7	98,6	1 883
Total 2015	91,0	92,9	90,7	11 138
Total 2011	84,9	87,0	84,3	7 053

Nota: La estimación se refiere a los nacimientos en el período de 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Solo se incluye el último nacimiento de la mujer. Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Se refiere a los nacimientos que tuvieron lugar en un servicio de salud (público o privado).

2/ Profesional de salud calificado incluye médico, obstetra y enfermera.

3/ El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Según ámbito geográfico, existió una diferencia de 23,5 puntos porcentuales en la cobertura de partos institucionales entre el área urbana y rural (96,7% frente a 73,2%). En las regiones de la Selva (77,1%) y la Sierra (86,8%) se apreciaron los menores porcentajes de parto institucional. Similar comportamiento se manifestó en los departamentos de Loreto (64,1%), Amazonas (72,4%), Cajamarca (76,3%), Puno (80,3%) y Ucayali (83,9%).

CUADRO N° 8.9
PERÚ: PARTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PARTOS ATENDIDOS POR PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO Y PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Partos en establecimientos de salud 1/	Partos atendidos por profesional de salud calificado 2/	Parto institucional 3/	Número de nacimientos
Área de residencia				
Urbana	96,8	98,0	96,7	8 294
Rural	74,2	78,2	73,2	2 844
Región natural				
Lima Metropolitana 4/	98,2	99,3	98,2	3 256
Resto Costa	95,2	96,9	95,1	2 959
Sierra	87,3	90,4	86,8	3 011
Selva	78,2	79,8	77,1	1 912
Departamento				
Amazonas	74,1	76,7	72,4	174
Áncash	93,0	95,3	92,8	398
Apurímac	98,2	98,9	98,2	167
Arequipa	97,7	98,1	97,5	407
Ayacucho	96,3	96,7	96,0	201
Cajamarca	77,4	80,8	76,3	598
Prov. Const. del Callao	99,1	99,8	99,1	377
Cusco	97,6	98,3	96,8	423
Huancavelica	91,1	91,9	90,2	148
Huánuco	94,5	95,8	94,4	267
Ica	99,0	99,5	99,0	361
Junín	86,4	90,6	86,3	409
La Libertad	86,8	92,0	86,8	719
Lambayeque	90,6	91,4	90,3	444
Lima	97,9	99,2	97,9	3 274
Provincia de Lima 5/	98,0	99,3	98,0	2 879
Lima Provincias 6/	96,9	98,3	96,9	396
Loreto	66,4	66,4	64,1	562
Madre de Dios	95,3	96,9	95,3	67
Moquegua	98,5	98,6	98,3	60
Pasco	89,9	91,3	89,7	110
Piura	87,1	90,3	87,1	785
Puno	80,8	88,1	80,3	356
San Martín	87,7	88,6	87,1	369
Tacna	93,5	97,7	93,2	111
Tumbes	96,7	98,5	96,7	104
Ucayali	84,7	84,9	83,9	245
Total 2015	91,0	92,9	90,7	11 138
Total 2011	84,9	87,0	84,3	7 053

Nota: La estimación se refiere a los nacimientos en el período de 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Solo se incluye el último nacimiento de la mujer.

1/ Se refiere a los nacimientos que tuvieron lugar en un servicio de salud (público o privado).

2/ Profesional de salud calificado incluye médico, obstetrix y enfermera.

3/ El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.

4/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

5/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

6/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Asistencia durante el parto

Este indicador, conjuntamente con el lugar del parto, es importante para asegurar la salud de la madre y el niño o niña por nacer, asimismo, se utiliza para monitorear el progreso en la Salud Materna en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tipo de atención durante el parto

- Entre los años 2011 y 2015, se advierte un incremento de atención de parto por médico (de 52,3% a 63,8%). En contraste, la atención de parto por obstetrix disminuyó de 30,2% a 26,3%. Asimismo, la atención por comadrona/partera, bajó de 7,1% en el año 2011 a 4,5% en el año 2015.
- Según características de la mujer son marcadas las diferencias en el tipo de profesional que atiende al parto. Así, el porcentaje de atención por médico fue mayor entre las mujeres con el primer nacimiento en comparación con el sexto o mayor (70,4% frente a 38,1%). Sin embargo, los diferenciales fueron más notorios con la educación o capacidad económica de la madre. El porcentaje de atención por un médico fue 1,2 veces más alto si la madre tiene educación superior que si no tiene educación (80,8% frente a 37,5%) y fue aún mayor si pertenece al quintil superior (86,3%) en relación con madres del quintil inferior de riqueza (33,6%).
- De otro lado, el porcentaje de partos atendidos por obstetrix fue mayor en el caso de las madres ubicadas en el segundo quintil y quintil inferior de riqueza (34,1% y 32,9%, respectivamente) y en las menores de 20 años de edad (31,7%).
- La asistencia del parto por “Comadrona/Partera” se realizó en mayor proporción cuando se trata de partos no institucionales (44,0%), en mujeres ubicadas en el quintil inferior (16,0%), con el sexto o posterior nacimiento (14,9%) y en aquellas sin educación (14,6%). Finalmente, en lo que parece ser un aspecto de connotación netamente cultural en el país, todavía existen casos de partos que fueron atendidos por familiares/otros, como a madres con el sexto o posterior nacimiento (11,6%), mujeres ubicadas en el quintil inferior (10,2%) y aquellas sin educación (10,0%).
- El nacimiento por cesárea, que se estima debe situarse entre 5,0% y 15,0% de todos los nacimientos como solución final a complicaciones del embarazo y parto, continúa aumentando en el Perú. Así, se incrementó de 22,9% a 31,6% entre los años 2011 y 2015. Al desagregar la cifra por características de la madre, se revelan importantes contrastes. Se observó que los mayores porcentajes de cesáreas se realizaron entre mujeres del quintil superior (55,9%) o con educación superior (50,2%). En cambio, las mujeres sin educación y ubicadas en el quintil inferior de riqueza (6,5% y 10,7%, respectivamente) muestran los menores niveles

CUADRO N° 8.10
PERÚ: ATENCIÓN DURANTE EL PARTO PARA LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, POR PERSONA QUE PROPORCIONÓ LA ATENCIÓN Y PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Persona que proporcionó la atención del parto							Porcentaje de partos por profesional de salud calificado 1/	Porcentaje de nacimientos por cesárea	Número de nacimientos
		Médico	Obstetrix	Enfermera	Técnico en enfermería/Promotor de salud	Comadrona / Partera	Familiar/Otro	Nadie			
Edad de la madre al nacimiento											
Menos de 20 años	100,0	55,3	31,7	2,1	0,8	6,1	3,8	0,2	89,1	21,5	1 803
20-34	100,0	63,8	26,7	1,4	0,5	4,3	2,9	0,3	91,9	31,5	8 904
35-49	100,0	70,3	20,6	1,5	0,7	4,0	2,7	0,2	92,3	39,8	2 405
Orden de nacimiento											
Primer nacimiento	100,0	70,4	23,9	1,2	0,4	2,7	1,3	0,0	95,6	37,8	4 377
2-3	100,0	65,0	26,8	1,3	0,5	3,5	2,6	0,2	93,2	32,4	6 295
4-5	100,0	53,2	29,6	2,0	0,9	8,7	5,1	0,5	84,8	21,4	1 738
6 y más	100,0	38,1	28,3	3,6	2,0	14,9	11,6	1,4	70,1	12,0	702
Lugar del parto											
Establecimiento de salud	100,0	70,2	28,2	1,1	0,3	0,0	0,1	0,0	99,6	35,3	11 763
Otro lugar	100,0	7,8	9,3	4,9	3,1	44,0	28,5	2,4	22,0	0,0	1 347
Nivel de educación											
Sin educación	100,0	37,5	29,4	6,0	1,4	14,6	10,0	1,0	73,0	6,5	226
Primaria	100,0	43,7	29,9	3,5	1,5	12,5	8,1	0,8	77,1	15,1	2 979
Secundaria	100,0	64,0	29,5	1,2	0,5	2,8	1,9	0,1	94,6	29,0	6 074
Superior	100,0	80,8	18,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0,0	99,2	50,2	3 835
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	100,0	33,6	32,9	4,2	2,2	16,0	10,2	0,8	70,7	10,7	3 028
Segundo quintil	100,0	59,4	34,1	1,5	0,3	2,8	1,7	0,2	95,0	24,2	2 923
Quintil intermedio	100,0	71,1	26,5	0,8	0,1	0,7	0,9	0,0	98,3	33,7	2 674
Cuarto quintil	100,0	79,5	19,7	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	99,4	43,3	2 340
Quintil superior	100,0	86,3	13,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	99,7	55,9	2 147
Total 2015	100,0	63,8	26,3	1,5	0,6	4,5	3,0	0,3	91,6	31,6	13 112
Total 2011	100,0	52,3	30,2	2,6	1,7	7,1	5,6	0,6	85,0	22,9	8 426

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotaes o el 100,0% debido a redondeo. Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0 - 59 meses antes de la entrevista. Si la mujer mencionó más de una persona, solamente se considera la más capacitada.

1/ Profesional de salud calificado incluye médico, obstetrix y enfermera.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ámbito geográfico

- Por área de residencia, más mujeres fueron atendidas por un médico en el área urbana que en el área rural (72,7% frente a 39,5%); por región natural, fue en Lima Metropolitana en relación con la Selva (84,2% frente a 37,7%). A nivel departamental se registró gran disparidad, como las diferencias entre el 83,5% de partos atendidos por un médico en Lima, 78,5% en la Provincia Constitucional del Callao y 77,4% en Arequipa comparado con Loreto (29,1%), Huánuco (29,7%) y Ucayali (31,4%).
- La atención del parto por obstetrix fue superior al promedio nacional (26,3%) en 16 departamentos, destacando: Huánuco (62,0%), Ayacucho (52,4%), Ucayali (49,2%) y San Martín (42,9%) con los mayores porcentajes. Similar comportamiento se presentaron en las regiones de la Selva y la Sierra (36,0% y 33,5%, respectivamente) y en el área rural (31,8%).

- La asistencia del parto por “Comadrona/Partera” fue más empleada en el área rural (13,4%) y en la región de la Selva (13,1%). Asimismo, en Loreto (23,7%), Cajamarca (14,7%) y San Martín (10,0%). Finalmente, existen lugares donde una parte importante de los partos fueron atendidos por familiares/ otros, como Amazonas (13,2%), Ucayali (11,5%) y Puno (10,1%).
- Con respecto a los nacimientos por cesárea, estos se efectuaron en mayor proporción en Lima Metropolitana y en el área urbana (44,8% y 38,5%, respectivamente). Y a nivel departamental, en Tumbes (45,2%), Lima (44,0%) y Moquegua con 39,4%.

CUADRO Nº 8.11
PERÚ: ATENCIÓN DURANTE EL PARTO PARA LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, POR PERSONA QUE
PROPORCIONÓ LA ATENCIÓN Y PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Persona que proporcionó la atención del parto							Porcentaje de partos por profesional de salud calificado 1/	Porcentaje de nacimientos por cesárea	Número de nacimientos
		Médico	Obstetrix	Enfermera	Técnico en enfermería/ Promotor de salud	Comadrona/ Partera	Familiar/ Otro	Nadie			
Área de residencia											
Urbana	100,0	72,7	24,3	0,7	0,1	1,3	0,9	0,1	97,7	38,5	9 620
Rural	100,0	39,5	31,8	3,7	2,0	13,4	8,8	0,7	75,0	12,9	3 492
Región natural											
Lima Metropolitana 2/	100,0	84,2	14,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	99,3	44,8	3 769
Resto Costa	100,0	70,5	24,9	0,7	0,2	3,0	0,6	0,0	96,1	37,7	3 439
Sierra	100,0	52,9	33,5	2,8	0,8	4,8	4,7	0,6	89,2	20,4	3 557
Selva	100,0	37,7	36,0	2,6	1,9	13,1	8,2	0,5	76,3	18,7	2 347
Departamento											
Amazonas	100,0	42,7	25,4	4,7	3,9	9,5	13,2	0,7	72,8	16,9	211
Áncash	100,0	61,0	30,6	2,6	0,4	1,9	2,9	0,7	94,2	27,8	458
Apurímac	100,0	68,3	29,9	0,6	0,0	0,0	1,0	0,2	98,8	23,3	193
Arequipa	100,0	77,4	20,2	0,6	0,2	0,7	0,8	0,0	98,3	37,3	476
Ayacucho	100,0	42,5	52,4	1,7	0,3	0,4	2,5	0,2	96,5	21,3	230
Cajamarca	100,0	50,0	24,6	5,3	2,5	14,7	1,7	1,1	80,0	17,9	688
Prov. Const. del Callao	100,0	78,5	20,9	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	99,7	39,4	445
Cusco	100,0	64,9	30,9	2,0	0,1	0,1	1,9	0,1	97,7	20,9	502
Huancavelica	100,0	46,8	41,4	2,6	0,8	1,1	6,7	0,6	90,8	12,8	181
Huánuco	100,0	29,7	62,0	4,1	0,4	1,1	2,1	0,6	95,8	16,9	304
Ica	100,0	71,0	28,3	0,3	0,1	0,0	0,4	0,0	99,5	37,7	425
Junín	100,0	49,0	38,9	0,9	0,2	1,6	9,3	0,2	88,8	20,0	474
La Libertad	100,0	70,2	18,8	2,1	0,1	5,0	3,4	0,4	91,0	34,2	839
Lambayeque	100,0	65,6	22,8	0,4	0,2	9,4	1,2	0,3	88,8	33,9	543
Lima	100,0	83,5	15,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	99,1	44,0	3 777
Provincia de Lima 3/	100,0	85,0	14,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,1	99,3	45,5	3 324
Lima Provincias 4/	100,0	72,4	24,9	0,3	0,0	1,0	1,4	0,0	97,7	32,5	452
Loreto	100,0	29,1	30,6	2,7	3,6	23,7	9,5	0,8	62,4	15,8	732
Madre de Dios	100,0	75,7	20,3	0,8	0,0	1,1	2,1	0,0	96,9	24,0	79
Moquegua	100,0	71,9	26,3	0,4	0,0	0,4	0,9	0,0	98,6	39,4	68
Pasco	100,0	52,7	34,5	2,5	0,3	0,4	8,9	0,6	89,8	24,1	127
Piura	100,0	59,6	27,4	1,2	0,7	8,5	2,4	0,2	88,2	35,3	929
Puno	100,0	46,4	34,9	4,1	1,0	3,4	10,1	0,2	85,4	16,7	439
San Martín	100,0	41,1	42,9	1,7	1,1	10,0	3,3	0,0	85,7	22,8	439
Tacna	100,0	62,4	33,9	1,4	0,2	0,5	1,7	0,0	97,6	36,8	128
Tumbes	100,0	61,5	36,4	0,4	0,0	1,3	0,3	0,0	98,4	45,2	119
Ucayali	100,0	31,4	49,2	0,7	0,4	6,4	11,5	0,4	81,4	18,4	307
Total 2015	100,0	63,8	26,3	1,5	0,6	4,5	3,0	0,3	91,6	31,6	13 112
Total 2011	100,0	52,3	30,2	2,6	1,7	7,1	5,6	0,6	85,0	22,9	8 426

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo. Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0 - 59 meses antes de la entrevista. Si la mujer mencionó más de una persona, solamente se considera la más capacitada.

1/ Profesional de salud calificado incluye médico, obstetrix y enfermera.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

8.3 CUIDADO POSTNATAL DE LAS MADRES

El control postnatal, especialmente si ocurre tempranamente, es importante para reconocer signos de peligro para la madre y la niña o el niño recién nacido. Estos episodios de peligro pueden ser la hemorragia postparto en la madre, la asfixia de la o del recién nacido, o la infección en ambos.

Niveles y momento del control postnatal de los últimos nacimientos

- El 76,0% de mujeres tuvo un primer control postnatal dentro de las primeras cuatro horas después del parto, lo que fue una situación ventajosa. Si se añade la proporción que la tuvo entre las 4 y 23 horas postparto, el 94,9% de mujeres tuvieron su control postnatal antes de los dos días después del parto.
- Los porcentajes difieren por características de las mujeres. Así, el 69,1% de mujeres con el sexto o posterior nacimiento tuvieron un control antes de las cuatro horas postparto. Asimismo, las mujeres del quintil inferior de riqueza (70,7%). De manera similar, las bajas proporciones de control temprano están relacionadas con altos porcentajes de mujeres que no recibieron control alguno, como fue el caso de las mujeres con el sexto o posterior nacimiento (12,1%), ubicadas en el quintil inferior (10,1%) y aquellas sin educación (9,0%).

CUADRO N° 8.12
PERÚ: MOMENTO DEL PRIMER CONTROL POSTNATAL DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON HIJAS Y/O HIJOS EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Momento del primer control postnatal				No recibió atención postnatal 1/	Número de nacimientos
		Menos de 4 horas	4-23 horas	2 días	3-41 días		
Edad de la madre al nacimiento							
Menos de 20 años	100,0	73,0	19,8	1,1	1,6	4,6	1 411
20-34	100,0	76,2	19,1	0,8	1,2	2,8	7 506
35-49	100,0	77,5	17,8	0,9	1,5	2,3	2 221
Orden de nacimiento							
Primer nacimiento	100,0	75,2	21,6	0,7	0,7	1,8	3 568
2-3	100,0	77,5	18,6	0,7	0,9	2,2	5 495
4-5	100,0	75,4	16,0	1,3	2,7	4,6	1 483
6 y más	100,0	69,1	12,5	1,3	5,0	12,1	593
Nivel de educación							
Sin educación	100,0	75,7	10,2	1,5	3,5	9,0	180
Primaria	100,0	74,7	12,8	1,0	3,8	7,7	2 398
Secundaria	100,0	77,5	18,9	0,8	0,8	2,1	5 190
Superior	100,0	74,8	23,8	0,8	0,1	0,5	3 371
Quintil de riqueza							
Quintil inferior	100,0	70,7	13,2	1,7	4,3	10,1	2 393
Segundo quintil	100,0	79,2	17,8	0,7	0,9	1,5	2 489
Quintil intermedio	100,0	77,3	21,2	0,5	0,4	0,7	2 336
Cuarto quintil	100,0	76,1	22,1	0,6	0,2	1,0	2 037
Quintil superior	100,0	77,2	21,4	0,7	0,2	0,5	1 883
Total	100,0	76,0	18,9	0,8	1,3	2,9	11 138

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Según ámbito geográfico, en la Selva y en el área rural, el 68,8% y 72,4%, respectivamente, de mujeres tuvieron un control antes de las cuatro horas postparto. De igual manera, en Loreto (54,8%) y Amazonas (59,6%).
- También existieron algunos departamentos donde a pesar de que una buena proporción de mujeres han tenido un control postnatal temprano, un alto porcentaje todavía no recibió ningún control, como fue el caso de Loreto (21,2%) y Amazonas (19,0%). Asimismo, en la región de la Selva (11,1%).

CUADRO N° 8.13
PERÚ: MOMENTO DEL PRIMER CONTROL POSTNATAL DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON
HIJAS Y/O HIJOS EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Momento del primer control postnatal				No recibió atención postnatal 1/	Número de nacimientos
		Menos de 4 horas	4-23 horas	2 días	3-41 días		
Área de residencia							
Urbana	100,0	77,3	20,3	0,6	0,6	1,2	8 294
Rural	100,0	72,4	14,9	1,5	3,3	7,8	2 844
Región natural							
Lima Metropolitana 2/	100,0	75,8	22,7	0,4	0,3	0,8	3 256
Resto Costa	100,0	79,2	18,3	0,5	0,9	1,1	2 959
Sierra	100,0	77,8	17,5	1,3	1,5	1,8	3 011
Selva	100,0	68,8	15,6	1,4	3,2	11,1	1 912
Departamento							
Amazonas	100,0	59,6	15,6	3,2	2,6	19,0	174
Áncash	100,0	77,1	20,3	1,3	0,5	0,8	398
Apurímac	100,0	85,5	13,5	0,3	0,6	0,0	167
Arequipa	100,0	69,4	28,0	1,0	0,7	1,0	407
Ayacucho	100,0	80,6	18,0	0,6	0,3	0,5	201
Cajamarca	100,0	87,1	10,4	0,0	0,6	1,9	598
Prov. Const. del Callao	100,0	75,0	23,4	0,4	0,1	1,1	377
Cusco	100,0	77,8	21,2	0,7	0,1	0,2	423
Huancavelica	100,0	89,6	8,3	0,9	0,8	0,4	148
Huánuco	100,0	71,2	25,5	1,2	0,6	1,5	267
Ica	100,0	80,1	18,5	1,0	0,2	0,3	361
Junín	100,0	79,8	15,0	1,4	1,9	1,8	409
La Libertad	100,0	75,7	18,3	1,0	3,1	1,8	719
Lambayeque	100,0	84,4	10,8	0,3	2,0	2,5	444
Lima	100,0	76,0	22,5	0,4	0,3	0,8	3 274
Provincia de Lima 3/	100,0	75,9	22,7	0,4	0,3	0,7	2 879
Lima Provincias 4/	100,0	76,7	21,4	0,2	0,7	1,1	396
Loreto	100,0	54,8	15,4	2,0	6,5	21,2	562
Madre de Dios	100,0	72,7	23,5	0,8	0,9	2,0	67
Moquegua	100,0	70,6	28,4	0,0	0,7	0,2	60
Pasco	100,0	78,6	14,0	1,0	2,1	4,3	110
Piura	100,0	77,4	17,7	0,3	1,8	2,8	785
Puno	100,0	73,3	19,2	4,1	1,2	2,2	356
San Martín	100,0	80,7	11,2	0,8	2,0	5,2	369
Tacna	100,0	79,9	18,3	1,0	0,6	0,2	111
Tumbes	100,0	84,4	12,2	1,2	0,9	1,3	104
Ucayali	100,0	66,9	17,9	1,2	2,4	11,7	245
Total	100,0	76,0	18,9	0,8	1,3	2,9	11 138

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Niveles y momento del control postnatal de los últimos nacimientos que no ocurrieron en un establecimiento de salud

- Entre las mujeres que no dieron a luz en un establecimiento de salud, el 25,8% no recibió atención postnatal. Aunque esta condición constituye una situación en extremo riesgosa, considerando que una alta proporción de las muertes maternas ocurren en el postparto, se evidencia una disminución favorable desde el año 2011 (29,7%). Sin embargo, por característica seleccionada fue mayor entre las mujeres con el sexto o posterior nacimiento (38,1%), en las menores de 20 años de edad (33,2%) y entre las ubicadas en el quintil inferior (31,1%).

CUADRO N° 8.14
PERÚ: MOMENTO DEL PRIMER CONTROL POSTNATAL PARA EL NACIMIENTO MÁS RECIENTE DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE NO NACIÓ EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Momento del primer control postnatal				No recibió atención postparto 1/	Número de nacimientos
		Menos de 4 horas	4-23 horas	2 días	3-41 días		
Edad de la madre al nacimiento							
Menor de 20 años	100,0	39,1	11,5	3,8	12,4	33,2	150
20-34	100,0	45,4	11,3	4,8	12,7	25,8	666
35-49	100,0	45,8	13,3	5,8	15,3	19,8	186
Orden de nacimiento							
Primer nacimiento	100,0	50,3	12,0	2,7	11,1	23,9	178
2-3	100,0	49,7	11,6	5,5	11,0	22,2	415
4-5	100,0	41,8	11,4	5,8	16,5	24,5	232
6 y más	100,0	30,2	12,1	4,0	15,6	38,1	175
Nivel de educación							
Sin educación	100,0	44,9	8,7	4,8	11,9	29,8	49
Primaria	100,0	41,6	10,3	3,5	15,4	29,2	562
Secundaria	100,0	45,0	14,5	6,3	11,0	23,2	332
Superior	100,0	70,2	12,1	8,9	4,3	4,5	58
Quintil de riqueza							
Quintil inferior	100,0	39,3	10,8	4,6	14,2	31,1	724
Segundo quintil	100,0	50,7	15,2	5,8	13,1	15,1	159
Quintil intermedio	100,0	59,5	15,3	4,6	11,8	8,8	58
Cuarto quintil	100,0	73,2	6,6	6,4	2,6	11,2	38
Quintil superior	100,0	(81,4)	(15,6)	(3,0)	(0,0)	(0,0)	24
Total 2015	100,0	44,6	11,7	4,8	13,1	25,8	1 001
Total 2011	100,0	34,5	10,3	6,9	18,6	29,7	1 053

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo. Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0-59 meses antes de la entrevista. Solamente se incluye el último nacimiento de la entrevistada. Si la mujer mencionó más de una persona solamente se considera la más capacitada en el cuadro. Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Por ámbito geográfico, se presentó más en la región de la Selva (48,0%), en el área rural (28,4%) y en los departamentos de la Selva como Ucayali (72,1%), Amazonas (62,0%) y Loreto (61,1%).

CUADRO Nº 8.15
PERÚ: MOMENTO DEL PRIMER CONTROL POSTNATAL PARA EL NACIMIENTO MÁS RECIENTE DE MUJERES DE
15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE NO NACIÓ EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LOS CINCO AÑOS
ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Momento del primer control postnatal				No recibió atención postparto 1/	Número de nacimientos
		Menos de 4 horas	4-23 horas	2 días	3-41 días		
Área de residencia							
Urbana	100,0	53,4	8,6	5,4	14,0	18,6	266
Rural	100,0	41,3	12,8	4,6	12,8	28,4	735
Región natural							
Lima Metropolitana 2/	100,0	(73,0)	(8,2)	(2,7)	(8,0)	(8,1)	60
Resto Costa	100,0	52,7	17,8	3,2	17,4	8,9	142
Sierra	100,0	57,9	14,0	6,5	10,8	10,7	382
Selva	100,0	25,4	8,0	4,1	14,5	48,0	417
Departamento							
Amazonas	100,0	17,3	6,1	5,7	8,9	62,0	45
Áncash	100,0	65,5	21,0	3,7	6,6	3,1	28
Apurímac	100,0	*	*	*	*	*	3
Arequipa	100,0	*	*	*	*	*	9
Ayacucho	100,0	(69,7)	(11,9)	(6,7)	(8,1)	(3,6)	7
Cajamarca	100,0	83,5	7,0	0,0	2,7	6,8	135
Prov. Const. del Callao	100,0	*	*	*	*	*	3
Cusco	100,0	*	*	*	*	*	10
Huancavelica	100,0	68,2	10,2	8,2	9,0	4,3	13
Huánuco	100,0	(57,4)	(14,1)	(13,0)	(10,4)	(5,0)	15
Ica	100,0	*	*	*	*	*	4
Junín	100,0	33,5	33,0	7,9	14,1	11,5	56
La Libertad	100,0	47,7	13,6	5,5	22,8	10,3	95
Lambayeque	100,0	54,6	8,2	2,2	20,0	15,0	42
Lima	100,0	73,0	5,4	3,2	10,7	7,7	69
Provincia de Lima 3/	100,0	(77,2)	(2,9)	(2,8)	(8,4)	(8,6)	57
Lima Provincias 4/	100,0	*	*	*	*	*	12
Loreto	100,0	9,9	5,2	4,4	19,3	61,1	189
Madre de Dios	100,0	(26,1)	(24,9)	(12,8)	(17,9)	(18,2)	3
Moquegua	100,0	*	*	*	*	*	1
Pasco	100,0	26,7	8,1	8,1	19,7	37,4	11
Piura	100,0	45,8	22,8	2,3	13,0	16,1	101
Puno	100,0	54,6	12,0	16,4	6,0	11,0	68
San Martín	100,0	34,5	5,6	4,0	15,6	40,2	45
Tacna	100,0	(68,1)	(12,7)	(7,4)	(8,7)	(3,0)	7
Tumbes	100,0	*	*	*	*	*	3
Ucayali	100,0	4,9	3,3	4,0	15,8	72,1	37
Total 2015	100,0	44,6	11,7	4,8	13,1	25,8	1 001
Total 2011	100,0	34,5	10,3	6,9	18,6	29,7	1 053

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo. Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0-59 meses antes de la entrevista. Solamente se incluye el último nacimiento de la entrevistada. Si la mujer mencionó más de una persona solamente se considera la más capacitada en el cuadro. Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Persona que proporcionó la atención postnatal en los últimos nacimientos

- Del total de los últimos nacimientos que recibieron control postnatal, el 36,0% de ellos fueron atendidos por médico, seguido por obstetriz y enfermera (28,7% y 28,6%, respectivamente); en conjunto, representaron un total de 93,3% de mujeres atendidas por un personal calificado. Es importante resaltar la muy baja participación de otro trabajador de salud o comadrona/partera como proveedores de atención postnatal.
- Se aprecian nuevamente los conocidos diferenciales para este servicio. Así, solo 20,7% de mujeres del quintil inferior de riqueza recibieron atención postnatal por médico, comparado con el 47,5% entre mujeres del quintil superior. En forma similar, solo el 26,5% de mujeres sin educación accedieron al médico para su primer control postnatal en comparación con el 44,0% de aquellas con educación superior.

CUADRO N° 8.16
PERÚ: PERSONA QUE PROPORCIONÓ EL PRIMER CONTROL POSTNATAL A LA MADRE DESPUÉS DEL NACIMIENTO
MÁS RECIENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Persona que proporcionó a la madre primer control postparto						No recibió atención postparto 1/	Número de nacimientos
		Médico	Obstetriz	Enfermera	Otro trabajador de la salud	Comadrona/Partera	Otro		
Edad de la madre al nacimiento									
Menos de 20 años	100,0	31,6	29,3	30,1	3,0	1,2	0,1	4,6	1 411
20-34	100,0	35,7	30,2	27,7	2,4	1,0	0,2	2,8	7 506
35-49	100,0	39,6	23,1	30,4	2,9	1,6	0,1	2,3	2 221
Orden de nacimiento									
Primer nacimiento	100,0	37,5	26,6	31,1	2,1	0,8	0,2	1,8	3 568
2-3	100,0	36,7	29,3	28,3	2,6	0,8	0,1	2,2	5 495
4-5	100,0	32,7	31,3	25,5	3,2	2,5	0,2	4,6	1 483
6 y más	100,0	28,0	28,8	23,4	4,1	3,1	0,4	12,1	593
Nivel de educación									
Sin educación	100,0	26,5	25,9	27,2	3,9	7,2	0,3	9,0	180
Primaria	100,0	25,6	32,2	27,4	3,7	3,3	0,1	7,7	2 398
Secundaria	100,0	35,8	29,9	29,0	2,4	0,6	0,2	2,1	5 190
Superior	100,0	44,0	24,4	28,7	2,0	0,2	0,1	0,5	3 371
Quintil de riqueza									
Quintil inferior	100,0	20,7	35,5	24,8	4,7	4,1	0,1	10,1	2 393
Segundo quintil	100,0	33,1	34,8	27,7	1,9	0,7	0,2	1,5	2 489
Quintil intermedio	100,0	38,8	27,5	30,0	2,6	0,1	0,3	0,7	2 336
Cuarto quintil	100,0	43,4	23,8	29,2	2,2	0,2	0,1	1,0	2 037
Quintil superior	100,0	47,5	18,5	32,0	1,3	0,2	0,0	0,5	1 883
Total	100,0	36,0	28,7	28,6	2,6	1,2	0,2	2,9	11 138

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotaes o el 100,0% debido a redondeo.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- A nivel departamental, subsisten marcadas diferencias de control postnatal por médico en Arequipa (55,3%), la Provincia Constitucional del Callao (49,6%) y La Libertad (45,9%); en tanto que, lo contrario ocurre con Loreto y San Martín donde solo el 18,9% y 20,9%, respectivamente, de mujeres fueron atendidas por médico.

- Por otro lado, en algunas zonas alejadas de la Sierra y Selva, los porcentajes de atención postnatal por obstetriz fueron más elevados y por encima de lo encontrado con médico. Tal fue el caso de Huancavelica (52,5%), Ucayali (51,3%), Huánuco (49,1%) y Ayacucho (48,5%).

CUADRO N° 8.17
PERÚ: PERSONA QUE PROPORCIONÓ EL PRIMER CONTROL POSTNATAL A LA MADRE DESPUÉS DEL NACIMIENTO
MÁS RECIENTE, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Persona que proporcionó a la madre primer control postparto						No recibió atención postparto 1/	Número de nacimientos
		Médico	Obstetriz	Enfermera	Otro trabajador de la salud	Comadrona/ Partera	Otro		
Área de residencia									
Urbana	100,0	40,2	26,5	29,5	2,1	0,3	0,2	1,2	8 294
Rural	100,0	23,5	35,1	25,7	4,1	3,7	0,1	7,8	2 844
Región natural									
Lima Metropolitana 2/	100,0	44,0	18,1	34,8	2,2	0,0	0,1	0,8	3 256
Resto Costa	100,0	40,2	27,2	28,6	1,6	1,0	0,2	1,1	2 959
Sierra	100,0	31,7	36,5	25,2	2,6	2,1	0,1	1,8	3 011
Selva	100,0	22,5	36,3	23,3	4,7	1,8	0,3	11,1	1 912
Departamento									
Amazonas	100,0	25,1	30,1	21,4	3,6	0,7	0,0	19,0	174
Áncash	100,0	27,7	33,5	35,4	2,6	0,0	0,0	0,8	398
Apurímac	100,0	39,1	35,1	23,5	2,2	0,0	0,0	0,0	167
Arequipa	100,0	55,3	19,7	23,2	0,8	0,0	0,0	1,0	407
Ayacucho	100,0	25,1	48,5	23,7	2,1	0,1	0,1	0,5	201
Cajamarca	100,0	24,3	29,0	29,6	3,8	11,2	0,2	1,9	598
Prov. Const. del Callao	100,0	49,6	20,1	27,8	1,4	0,0	0,0	1,1	377
Cusco	100,0	34,3	41,7	23,2	0,4	0,1	0,2	0,2	423
Huancavelica	100,0	28,1	52,5	16,3	2,4	0,0	0,2	0,4	148
Huánuco	100,0	22,2	49,1	23,7	3,2	0,0	0,2	1,5	267
Ica	100,0	42,3	30,3	24,7	2,2	0,0	0,2	0,3	361
Junín	100,0	27,2	38,9	23,8	8,0	0,1	0,1	1,8	409
La Libertad	100,0	45,9	20,4	30,5	0,7	0,5	0,2	1,8	719
Lambayeque	100,0	43,7	30,9	18,0	0,7	4,0	0,1	2,5	444
Lima	100,0	43,1	18,8	34,9	2,2	0,0	0,1	0,8	3 274
Provincia de Lima 3/	100,0	43,3	17,9	35,7	2,3	0,0	0,1	0,7	2 879
Lima Provincias 4/	100,0	41,9	25,9	29,4	1,7	0,0	0,0	1,1	396
Loreto	100,0	18,9	27,5	24,1	7,6	0,0	0,7	21,2	562
Madre de Dios	100,0	37,6	23,2	34,6	2,6	0,0	0,0	2,0	67
Moquegua	100,0	34,1	36,2	26,9	2,5	0,0	0,0	0,2	60
Pasco	100,0	24,6	37,1	31,9	2,1	0,0	0,0	4,3	110
Piura	100,0	30,0	27,0	33,7	2,5	3,8	0,2	2,8	785
Puno	100,0	30,8	40,7	24,0	2,1	0,2	0,0	2,2	356
San Martín	100,0	20,9	45,2	23,3	3,8	1,4	0,2	5,2	369
Tacna	100,0	30,4	33,9	30,3	3,3	0,0	2,0	0,2	111
Tumbes	100,0	40,1	43,7	14,6	0,2	0,0	0,2	1,3	104
Ucayali	100,0	23,5	51,3	12,5	0,7	0,0	0,3	11,7	245
Total	100,0	36,0	28,7	28,6	2,6	1,2	0,2	2,9	11 138

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranta, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Persona que proporcionó la atención postnatal de los últimos nacimientos que no ocurrieron en un establecimiento de salud

- Del total de los últimos nacimientos que no ocurrieron en servicio de salud pero que recibieron atención postnatal, el 24,5% de ellos fueron atendidos por obstetriz, seguido por enfermera (18,1%) y luego por médico (12,8%). En cambio, con respecto al año 2011, se observa que se ha incrementado la participación de comadrona o partera como proveedor de atención postnatal.

CUADRO N° 8.18
PERÚ: PERSONA QUE PROPORCIONÓ EL PRIMER CONTROL POSTNATAL A LA MADRE
DESPUÉS DEL NACIMIENTO MÁS RECIENTE QUE NO OCURRIÓ EN UN ESTABLECIMIENTO
DE SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Persona que proporcionó la atención postparto					No recibió atención postparto 1/	Número de nacimientos
		Médico	Obstetriz	Enfermera	Otro trabajador de la salud	Comadrona/Partera		
Edad de la madre al nacimiento								
Menos de 20 años	100,0	12,4	18,9	16,0	8,7	10,8	33,2	150
20-34	100,0	12,7	26,7	17,2	6,2	11,4	25,8	666
35-49	100,0	13,5	21,1	23,2	4,6	17,7	19,8	186
Orden de nacimiento								
Primer nacimiento	100,0	18,7	20,4	18,3	4,9	13,8	23,9	178
2-3	100,0	14,8	27,2	17,8	7,1	11,0	22,2	415
4-5	100,0	10,0	26,8	16,5	6,4	15,7	24,5	232
6 y más	100,0	5,7	19,3	20,9	5,6	10,4	38,1	175
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	4,8	16,7	19,5	3,6	25,7	29,8	49
Primaria	100,0	9,0	23,2	17,9	6,8	13,9	29,2	562
Secundaria	100,0	15,8	28,0	18,4	6,2	8,4	23,2	332
Superior	100,0	38,8	24,1	17,6	3,5	11,5	4,5	58
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	8,3	21,4	17,9	7,6	13,6	31,1	724
Segundo quintil	100,0	16,7	32,9	19,9	3,7	11,7	15,1	159
Quintil intermedio	100,0	28,3	40,3	16,9	0,0	5,6	8,8	58
Cuarto quintil	100,0	29,5	24,4	19,2	4,7	11,1	11,2	38
Quintil superior	100,0	(58,0)	(23,0)	(15,1)	(0,0)	(4,0)	(0,0)	24
Total 2015	100,0	12,8	24,5	18,1	6,3	12,5	25,8	1 001
Total 2011 a/	100,0	10,2	25,4	15,4	10,3	8,7	29,7	1 053

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo. Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0-59 meses antes de la entrevista. Solamente se incluye el último nacimiento de la entrevistada. Si la mujer mencionó más de una persona, solamente la más capacitada se considera en el cuadro. Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

a/ El total incluye otro (0,2%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Para la Encuesta 2015, algunos diferenciales fueron evidentes y se mantienen al igual que en la Encuesta 2011, como el hecho que en el área urbana fue bastante mayor el porcentaje de atención postnatal proveído por médico u obstetriz; mientras que, en el área rural fue la enfermera.

CUADRO N° 8.19
PERÚ: PERSONA QUE PROPORCIONÓ EL PRIMER CONTROL POSTNATAL A LA MADRE
DESPUÉS DEL NACIMIENTO MÁS RECIENTE QUE NO OCURRIÓ EN UN ESTABLECIMIENTO
DE SALUD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Persona que proporcionó la atención postparto						No recibió atención postparto 1/	Número de nacimientos
	Total	Médico	Obstetriz	Enfermera	Otro trabajador de la salud	Comadrona/ Partera		
Área de residencia								
Urbana	100,0	23,9	31,1	16,3	2,0	8,1	18,6	266
Rural	100,0	8,8	22,1	18,8	7,8	14,1	28,4	735
Región natural								
Lima Metropolitana 2/	100,0	(32,6)	(33,3)	(23,0)	(2,9)	(0,0)	(8,1)	60
Resto Costa	100,0	23,2	28,4	15,9	3,6	20,0	8,9	142
Sierra	100,0	13,9	32,2	23,9	3,0	16,4	10,7	382
Selva	100,0	5,4	14,8	12,9	10,7	8,2	48,0	417
Departamento								
Amazonas	100,0	4,3	15,2	8,9	6,9	2,6	62,0	45
Áncash	100,0	19,7	33,1	37,8	6,3	0,0	3,1	28
Apurímac	100,0	*	*	*	*	*	*	3
Arequipa	100,0	*	*	*	*	*	*	9
Ayacucho	100,0	(11,1)	(67,6)	(12,4)	(5,3)	(0,0)	(3,6)	7
Cajamarca	100,0	1,9	9,6	25,9	6,0	49,7	6,8	135
Prov. Const. del Callao	100,0	*	*	*	*	*	*	3
Cusco	100,0	*	*	*	*	*	*	10
Huancavelica	100,0	16,4	56,8	21,0	1,6	0,0	4,3	13
Huánuco	100,0	(11)	(61,2)	(15,1)	(8,1)	(0,0)	(5,0)	15
Ica	100,0	*	*	*	*	*	*	4
Junín	100,0	7,9	52,4	16,0	11,3	0,8	11,5	56
La Libertad	100,0	21,4	37,1	27,6	0,6	3,0	10,3	95
Lambayeque	100,0	14,0	16,3	11,2	1,4	42,2	15,0	42
Lima	100,0	32,9	32,3	24,5	2,6	0,0	7,7	69
Provincia de Lima 3/	100,0	(30,1)	(33,9)	(24,3)	(3,1)	(0,0)	(8,6)	57
Lima Provincias 4/	100,0	*	*	*	*	*	*	12
Loreto	100,0	6,2	9,5	8,3	14,8	0,0	61,1	189
Madre de Dios	100,0	(22,5)	(24,8)	(26,7)	(7,8)	(0,0)	(18,2)	3
Moquegua	100,0	*	*	*	*	*	*	1
Pasco	100,0	2,0	13,7	40,8	6,1	0,0	37,4	11
Piura	100,0	12,3	23,1	15,2	4,1	29,2	16,1	101
Puno	100,0	21,7	39,5	24,1	2,8	0,9	11,0	68
San Martín	100,0	5,0	29,9	6,7	6,7	11,4	40,2	45
Tacna	100,0	(18,7)	(37,1)	(39,1)	(2,0)	(0,0)	(3,0)	7
Tumbes	100,0	*	*	*	*	*	*	3
Ucayali	100,0	8,3	12,6	5,2	1,8	0,0	72,1	37
Total 2015	100,0	12,8	24,5	18,1	6,3	12,5	25,8	1 001
Total 2011 a/	100,0	10,2	25,4	15,4	10,3	8,7	29,7	1 053

Nota: Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo. Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0-59 meses antes de la entrevista. Solamente se incluye el último nacimiento de la entrevistada. Si la mujer mencionó más de una persona, solamente la más capacitada se considera en el cuadro. Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Incluye mujeres que recibieron el control después de 41 días.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

a/ El total incluye otro (0,2%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Barreras en el acceso a servicios de salud

Se presenta a continuación, los resultados sobre las diversas respuestas de las mujeres entrevistadas respecto a los problemas para acceder a servicios de salud, cuando estuvieran enfermas. Se debe tener en cuenta que estas respuestas no son espontáneas sino son los porcentajes de las respuestas afirmativas a cada aspecto planteado.

- El 94,8% de las mujeres entrevistadas en el año 2015 reportaron algún problema para acceder a servicios de salud y tratarse de algún episodio de enfermedad. Esta cifra fue ligeramente menor que en el año 2011 (95,2%).
- Según motivos específicos, el 86,3% de mujeres manifestaron como problema la “falta de medicinas disponibles” y el 83,7% de mujeres respondió que “no había personal calificado que la atiende”. Otro problema manifestado fue “conseguir dinero para el tratamiento”, que fue expresado por el 55,3% de mujeres (menor en 3,2 puntos porcentuales al encontrado en el año 2011). Este problema se registró con menor porcentaje entre mujeres del quintil superior de riqueza (30,5%) o con educación superior (38,3%), en comparación con 77,7% de mujeres del quintil inferior y 81,9% de aquellas sin educación.
- El 50,4% de mujeres mencionó que “no había personal femenino” que la atiende en la consulta. Este problema se registró con menor porcentaje entre mujeres ubicadas en el quintil superior (36,9%), con educación superior (37,1%), que tuvieron uno a dos hijas y/o hijos vivos (44,4%) y entre las divorciadas, separadas o viudas (45,8%).
- La razón “distancia al establecimiento” como problema de acceso a los servicios de salud fue menor en 4,8 puntos porcentuales al encontrado en el año 2011 (37,5% frente a 42,3%). Esta razón, describe contrastes entre madres del quintil inferior comparadas con aquellas del quintil superior de riqueza (62,8% frente a 21,8%), entre madres sin educación en relación con las de educación superior (60,0% frente a 25,5%); y entre las que tienen cinco y más hijas y/o hijos y las que no los tienen (55,2% frente a 31,3%). Mientras que la razón “no quiere ir sola” representó el 39,4%.
- La necesidad de “tener que tomar transporte” para acceder a los servicios de salud está relacionada a la anterior razón (distancia al establecimiento) por lo que el patrón en los porcentajes de mujeres que mencionan dicha razón como problema de acceso fue similar, inclusive más contrastante entre las mujeres del quintil inferior en relación con las del quintil superior de riqueza (66,4% frente a 16,1%), por nivel de educación (68,3% para aquellas sin educación y 19,7% para las mujeres con educación superior); y entre mujeres con cinco y más hijas y/o hijos y las que no los tienen (57,7% frente a 25,8%).
- La dificultad de “conseguir permiso para ir a tratamiento de salud” fue expresado por un 17,1% de entrevistadas y sin diferencias notables por característica.

CUADRO N° 8.20
PERÚ: PROBLEMAS EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CUANDO
LAS MUJERES ESTÁN ENFERMAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2015
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Problemas en el acceso a la atención de la salud:									Número de mujeres
	Conseguir permiso para ir a tratamiento	Conseguir dinero para tratamiento	Distancia al establecimiento de salud	Tener que tomar transporte	No quiere ir sola	Preocupación que no haya personal femenino	Pensar que puede no haber quien atiende	Pensar que no haya medicinas disponibles	Cualquiera de las anteriores	
Edad										
15-19	15,9	48,4	34,1	28,7	52,1	61,0	85,5	88,4	96,4	5 983
20-34	15,5	52,3	35,4	32,2	36,1	48,9	83,5	85,5	94,3	15 737
35-49	19,4	61,6	41,3	38,8	37,7	47,5	83,0	86,4	94,6	14 046
Número de hijas e hijos vivos										
0	18,0	45,5	31,3	25,8	42,6	56,0	81,0	84,1	94,0	11 309
1-2	17,3	54,2	36,5	33,4	34,4	44,4	82,7	84,9	94,1	14 999
3-4	15,3	65,4	43,7	41,6	40,2	50,8	86,9	90,1	96,2	7 133
5 y más	17,2	79,2	55,2	57,7	53,6	60,9	93,1	94,7	98,5	2 325
Estado conyugal										
Nunca casada/unida	18,3	46,8	31,2	26,0	42,4	56,1	81,5	84,3	94,2	10 897
Casada/ unida	15,2	58,0	40,9	38,4	38,5	48,3	85,0	87,3	95,0	20 686
Divorciada/ separada/viuda	23,7	64,2	36,7	35,0	36,1	45,8	82,7	87,0	95,0	4 184
Condición de empleo últimos 12 meses										
No empleada	11,0	53,8	36,8	32,5	43,9	53,4	85,5	87,6	95,6	9 921
Empleada por dinero	19,8	53,9	35,1	31,8	35,4	47,3	82,0	85,0	94,1	22 945
Empleada no por dinero	17,2	71,3	58,4	59,5	55,3	65,0	91,0	92,3	97,5	2 900
Nivel de educación										
Sin educación	20,9	81,9	60,0	68,3	59,6	68,1	91,7	93,3	98,8	604
Primaria	17,4	76,3	56,1	57,8	51,9	63,5	91,4	93,5	97,8	6 930
Secundaria	15,5	57,4	37,3	33,3	41,0	53,5	86,3	89,6	96,5	16 655
Superior	19,1	38,3	25,5	19,7	28,5	37,1	74,8	76,9	90,2	11 576
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	18,6	77,7	62,8	66,4	55,5	66,1	93,0	94,2	98,2	6 007
Segundo quintil	15,9	66,3	44,6	42,8	44,8	56,4	90,9	92,8	97,6	6 884
Quintil intermedio	17,0	59,8	36,2	30,4	39,5	52,0	86,3	89,3	96,5	7 608
Cuarto quintil	17,5	47,8	28,0	22,9	33,7	44,4	80,4	84,6	94,7	7 803
Quintil superior	16,8	30,5	21,8	16,1	27,4	36,9	70,3	72,8	87,8	7 463
Total 2015	17,1	55,3	37,5	34,2	39,4	50,4	83,7	86,3	94,8	35 766
Total 2011	16,5	58,5	42,3	36,3	39,1	55,5	84,7	86,7	95,2	22 517

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Según ámbito geográfico, “conseguir dinero para el tratamiento” fue un problema grande en el área rural (73,3%), en departamentos como: Cajamarca (75,0%), Puno (74,2%), Ayacucho (73,3%) y Amazonas (73,2%); y en la región Sierra (66,2%).
- La razón “no había personal femenino” no pareció ser un problema importante entre mujeres residentes en Ucayali (33,4%), Lima Metropolitana (42,8%), la Provincia Constitucional del Callao (43,1%), Lima (43,2%), Arequipa (43,3%) y en el área urbana (46,7%).
- Con respecto a la razón “distancia al establecimiento” se observaron diferencias entre mujeres que residían en el área rural o urbana (62,6% frente a 30,9%). Según departamento, siguió siendo un problema en

Huancavelica (62,2%), Cajamarca (60,5%), Amazonas (56,4%) y Puno (55,5%).

- También se aprecian diferencias en la necesidad de “tener que tomar transporte” por área de residencia (65,0% frente a 26,2% rural/urbana). Nuevamente fue un problema en Huancavelica (62,0%), Amazonas (59,5%), Cajamarca (57,3%) y Puno (53,5%).

CUADRO N° 8.21
PERÚ: PROBLEMAS EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CUANDO
LAS MUJERES ESTÁN ENFERMAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Problemas en el acceso a la atención de la salud:									Número de mujeres
	Conseguir permiso para ir a tratamiento	Conseguir dinero para tratamiento	Distancia al establecimiento de salud	Tener que tomar transporte	No quiere ir sola	Preocupación que no haya personal femenino	Pensar que puede no haber quien atienda	Pensar que no haya medicinas disponibles	Cualquiera de las anteriores	
Área de residencia										
Urbana	16,9	50,7	30,9	26,2	35,4	46,7	81,2	84,2	93,9	28 380
Rural	17,9	73,3	62,6	65,0	54,9	64,6	93,1	94,4	98,3	7 386
Región natural										
Lima Metropolitana 1/	19,1	45,2	28,8	24,3	33,6	42,8	77,2	80,3	92,7	11 869
Resto Costa	14,0	53,3	32,4	28,7	36,7	49,5	82,4	85,9	93,9	9 323
Sierra	19,6	66,2	51,3	49,6	47,7	60,6	90,0	91,8	97,4	9 613
Selva	13,5	62,3	41,0	38,3	42,0	50,4	89,3	90,9	96,5	4 962
Departamento										
Amazonas	19,0	73,2	56,4	59,5	55,1	64,8	89,0	91,4	95,8	452
Áncash	13,4	68,7	47,0	45,6	48,5	62,0	91,3	92,8	98,4	1 314
Apurímac	18,7	68,9	43,2	49,7	48,1	59,8	96,9	96,7	99,0	513
Arequipa	19,6	51,5	39,9	38,2	40,2	43,3	80,2	82,2	94,3	1 598
Ayacucho	24,9	73,3	54,2	52,8	52,1	63,0	91,5	93,6	98,7	649
Cajamarca	13,7	75,0	60,5	57,3	55,7	68,4	94,2	95,3	98,4	1 791
Prov. Const. del Callao	13,8	42,9	25,0	21,0	32,4	43,1	76,0	82,4	92,6	1 282
Cusco	15,9	56,7	43,8	40,4	36,9	50,8	91,1	91,2	96,8	1 271
Huancavelica	21,5	69,7	62,2	62,0	56,7	71,7	95,2	96,6	98,8	422
Huánuco	14,5	63,0	47,7	48,9	42,9	53,4	92,2	93,5	97,6	817
Ica	17,2	50,5	29,8	28,2	37,2	50,6	80,0	84,4	94,2	1 001
Junín	18,7	60,5	44,5	37,9	43,7	56,6	89,9	92,3	97,2	1 355
La Libertad	15,0	52,7	39,6	35,7	38,6	54,1	72,3	81,4	90,6	2 209
Lambayeque	9,0	54,9	23,7	19,6	30,3	48,4	88,3	87,9	95,3	1 568
Lima	19,2	46,0	29,7	25,4	34,2	43,2	78,1	80,9	92,9	11 644
Provincia de Lima 2/	19,7	45,4	29,3	24,7	33,8	42,8	77,4	80,0	92,7	10 587
Lima Provincias 3/	14,3	51,3	33,4	32,1	37,8	46,9	85,1	89,6	95,6	1 058
Loreto	16,7	62,4	40,4	40,3	46,1	48,9	86,4	87,7	95,2	1 266
Madre de Dios	16,1	56,1	41,1	35,6	38,2	57,4	81,6	88,4	95,1	160
Moquegua	18,7	45,1	40,4	40,8	37,1	47,5	77,7	81,7	92,9	212
Pasco	18,2	57,3	47,3	46,5	43,5	58,6	93,9	93,8	99,2	287
Piura	15,5	59,5	37,4	31,5	41,3	52,6	87,5	89,3	95,7	2 394
Puno	30,1	74,2	55,5	53,5	50,8	65,8	91,4	94,5	97,8	1 278
San Martín	7,1	56,5	34,3	30,7	38,3	47,8	88,7	91,1	97,3	1 021
Tacna	19,4	48,8	28,7	26,4	29,1	44,6	75,5	76,4	87,6	384
Tumbes	14,0	48,9	39,2	32,6	39,4	53,8	75,9	83,6	92,6	299
Ucayali	8,1	60,4	21,0	18,4	22,7	33,4	92,9	91,8	97,2	579
Total 2013	17,1	55,3	37,5	34,2	39,4	50,4	83,7	86,3	94,8	35 766
Total 2009	16,5	58,5	42,3	36,3	39,1	55,5	84,7	86,7	95,2	22 517

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huachirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

